

MAP

Dedicated by the author.

SBORNÍK
VYSOKÉ SKOLY
ZEMĚDĚLSKÉ
V BRNĚ, ČSR.,
Fakulta Lesnická.

BULLETIN
DE L'ECOLE SUPÉRIEURE
D'AGRONOMIE
BRNO, RČS.,
FACULTÉ DE SILVICULTURE.

1927

SIGN. D 7.


Bull. E. sup. agron. Brno

DR. RICH. PICBAUER

ADDENDA AD FLORAM ČECHOSLOVAKIAE
MYCOLOGICAM III.

Cite as

(Now): Sborn. Chiv. pohyb. Ustř.



S PODPOROU MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ A NÁRODNÍ OSVĚTY VYDÁVÁ

VYSOKÁ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKÁ

V BRNĚ, ČERNÁ POLE.

REDAKTOR — RÉDACTEUR
PROF. EM. BAYER V BRNĚ,
ČERNÁ POLE, ČSR.

NA SKLADĚ MÁ — EN VENTE CHEZ
KNIHKUPEC A. PÍŠA, NAKLADATEL
V BRNĚ, ČESKÁ 28, ČSR.

MAPS

carded

**Addenda ad floram
Čechoslovakiae mycologicam.**

Pars VIII.

Auctore

Richard Picbauer.



Brno 1937.

**Extractus e Verhandlungen des Naturforschenden
Vereines in Brünn vol.**

[XVII, 704]

Addenda ad floram Čechoslovakiae mycologicam.

Pars VIII.

Dr. RICHARD PICBAUER.

Opera instituti phytopathologici Brunae (Brno in Čechoslovakia) nr. 137.

Addendorum ad floram Čechoslovakiae mycologorum edita sunt:

Addenda I. in Sborník Klubu Přírodovědeckého v Brně za r. 1924.
Tom. VII. 1925.

II. in Actis societatis scientiarum naturalium moravicae.
Tom. II. fasciculus 7. 1925.

III. in Sborník vysoké školy zemědělské v Brně, 1927.

IV. Ibidem 1929.

V. Ibidem 1931.

VI. in Actis societatis scientiarum naturalium moravicae.
Tom. VII. fasciculus 4. 1932.

VII. Ibidem — Tomus VIII. fasciculus 8. 1933.

His addendis fungi Čechoslovakiae, quos in finibus rei publicae nostrae legeram atque determinavi, adnotantur. Fungos locorum ad opidum Moraviae Kroměříž positorum cl. dom. Hynek ZAVŘEL, professor scholae agronomicae, legit paucosque etiam cl. dom. Doc. Dr. E. BAUDYS et cl. dom. Doc. Dr. SUZA legerant egoque omnes perspexi atque determinavi. Omnibus his dominis hoc loco meas maximas gratias agere meum est.

Iterum fungi nondum in finibus Moraviae vel Sloveniae observati, numero XXV, adnotantur hique stella signati sunt. Horum maxime memorabiles videntur: *Tubercinia cortusae* Liro, quae in montibus Sloveniae Malá Fatra detecta, adhuc e Turkestaniam solum nota erat. Etiam *Ustilago intermedia* in antheris *Scabiosae lucidae* (matricis novae), *Ustilago milii*, *Puccinia Lojkaiana*, *Puccinia Fuckelii*, *Propolis rhodoleuca* non minoris ponderis videntur. *Didymella salicis* Grove, quae adhuc in finibus rei publicae nostrae non observata, in culturis salicum ad oppidum Bzenec magnopere nocere solet.

Septem species novae describuntur: **Helotium moravicum**, quod ad ramos decessos ad Tišnov advenit, **Pyrenoperiza nigra**, quale ad caules *Dipsaci silvestris* ad Pouzdřany advenit, **Ascochyta**

Zavřelii Ignatii ad folia *Onopordonis acanthium*, **Septoria oenanthis** ad folia *Oenanthis aquaticae*, **Marsonina moravica** ad folia *Anemonis ranunculoidis*, **Hainesia Zavřelii Ignatii** ad folia *Lythri salicariae* et **Cerebella moravica** ad spicas *Alopecuri aequalis*, quae ad oppidum Kroměříž adveniunt.

Myxomycetes.

Spumaria alba (Bull.) D. C. Ad gramen et ramos *Coryli avellanae* ad Střelice prope Brno.

Phycomycetes.

Synchytrium aureum Schröt. Ad folia *Lysimachiae vulgaris* in colle Burda in collibus Kovačovské kopce ad Szob Sloveniae.

Pycnochytrium laetum Schröt. Ad folia *Gageae luteae* in hortis Květná zahrada in Kroměříž (leg. Zavřel).

Urophlyctis pulposa Schröt. Ad caules foliaque *Atriplicis fastatae* in vico Těšnovice ad Kroměříž (leg. Zavřel).

Peronospora rumicis Corda. Ad folia *Rumicis acetosae* ad ripas fluminis Morava ad Kroměříž (leg. Zavřel).

Peronospora litoralis Gäum. Ad folia *Atriplicis fastatae* ad Trávník prope Kroměříž (leg. Zavřel).

Peronospora media Gäum. Ad folia *Stellariae mediae* ad Kroměříž (leg. Zavřel).

Peronospora holostei Casp. Ad folia *Holostei umbellati* ad Ivančice.

Peronospora ranunculi Gäum. Ad folia *Ranunculi bulbosi* ad pagum Čebín prope Tišnov.

Peronospora scleranthi Rbh. Ad folia *Scleranthi perennis* ad Valečov pr. Něm. Brod (leg. Baudyš).

Peronospora bulbocapni Beck. Ad folia *Corydalis digitatae* in ripa fluminis Bečva in silva Plešovský les ad Kroměříž (leg. Zavřel).

Peronospora hesperidis Gäum. Ad folia *Hesperidis tristis* in colle Tabulová in collibus Pavlovské kopce ad Mikulov.

Peronospora meliloti Sydow. Ad folia *Meliloti albi* ad Kroměříž (leg. Zavřel).

Peronospora conglomerata Fuck. Ad folia *Geranii pusilli* in Kroměříž (leg. Zavřel).

Peronospora androsaces Niessl. Ad folia *Androsaces elongatae* ad Sct. Jakub ad Ivančice.

Peronospora valerianellae Fuck. Ad folia *Valerianellae olitoriae* ad Mor. Bránice prope Ivančice.

Peronospora calotheca D. B. Ad folia *Asperulae odoratae* in convalli Cvrčovská dolina ad Zdounky (leg. Zavřel).

Peronospora galii veri Gäum. Ad folia *Galii veri* ad Valečov pr. Něm. Brod (leg. Baudyš).

Peronospora cyparissias D. B. Ad folia *Euphorbiae cyparissias* in silva „Šebrov“ pr. Ochoz ad Brno.

Peronospora Raddii D. B. Ad anthodia *Anthemidis vulgaris* ad Nové Veselí pr. Žďár na Mor. (leg. Baudyš)

Peronospora Schleideni Ung. Ad folia *Allii cepa* in Všetuly ad Holešov (leg. Ing. Jar. Deyl).

Pseudoperonospora humuli Myabe et Takah. Ad folia *Humuli lupuli* in horto in Kroměříž (leg. Zavřel).

Plasmopara densa Schröt. Ad folia *Odontitis rubrae* in tegularia Medek ad Kroměříž (leg. Zavřel).

Albugo tragopogonis (Pers.) Gray. Ad folia *Inulae oculus Christi* in declivitate Rokytná pr. Mor. Krumlov.

Sclerospora graminicola (Sacc.) Schröt. Ad folia *Setariae viridis* ad molas Olšiny pr. Zdounky (leg. Zavřel).

Ascomycetes.

Taphrina insititiae (Sad.) Johans. In ramulis *Pruni domesticae* in Jasenné ad Vizovice (leg. Polášek).

Taphrina minor Sadeb. Ad folia *Pruni fruticosae* in colle Vejhon inter Blučina et Židlochovice, ad Dol. Kounice.

Taphrina betulae (Fuck.) Johans. Ad folia *Betulae pendulae* in silva ad collem Bunč in collibus Chřiby (leg. Zavřel), ad Netín et Dědkov pr. Vel. Meziříčí.

Taphrina Rostrupiana Giesenh. In fructibus *Pruni spinosae* in declivitate ad fundum Světlá in collibus Chřiby (leg. Zavřel).

Taphrina aurea (Pers.) Fr. Ad folia *Populi nigrae* ad Cvrčovice pr. Zdounky (leg. Zavřel).

Erysiphe eichoriacearum D. C. Ad folia *Calendulae officinalis* in horto in Kroměříž (leg. Zavřel).

Plantaginis maioris ad Kroměříž (leg. Zavřel).

Erysiphe polygoni D. C. Ad folia *Catalpae syringaetoliae* in hortis Květná zahrada in Kroměříž.

Ononidis spinosae in foliis *Circaeae lutetianae* in silva ad Zástřizly pr. Zdounky (leg. Zavřel).

Phylactinia corylea Sacc. Ad folia *Betulae albae* in silva ad Zástřizly pr. Zdounky (leg. Zavřel).

Microsphaera berberidis D. C. Ad folia *Berberidis vulgaris* in hortis Zámecká zahrada in Kroměříž (leg. Zavřel).

Microsphaera Mougeotii Lév. Ad folia *Lycii halimifolii* ad Popovice pr. Kroměříž (leg. Zavřel).

Microsphaera grossulariae Lév. Ad folia *Ribis grossulariae* in hortis Květná zahrada in Kroměříž (leg. Zavřel).

Choiromyces meandriformis Vitt. In silva ad Zdounky (leg. Zavřel), in silva Peklo ad Olší et in silva Kačín ad Netín pr. Vel. Meziříčí.

Chaetomium comatum (Tode) Fr. Ad caules veteres *Dafilliae variabilis* in Vel. Opatovice (leg. Baudyš).

**Didymella salicis* Grove. Ad ramos *Salicis capreae* ad Valečov pr. Něm Brod (leg. Baudyš).

Salicis americanae et amygdalinae ad Mor. Písek pr. Bzenec (leg. Baudyš).

Guignardia astragalina Rehm. Ad folia *Astragali ciceris* in declivitate Vinohrady ad molas Olšiny pr. Zdounky (leg. Zavřel).

Colorea chaetomium (Kze) Rbh. Ad folia *Rubi caesii* in pineto ad Těšany pr. Kroměříž (leg. Zavřel).

Rubi idaei in convalli ad Zástřizly pr. Zdounky (leg. Zavřel).

Stigmatea Robertiani Fr. Ad folia *Geranii Robertiani* in convalli ad Zástřizly pr. Zdounky (leg. Zavřel).

Mamiania coryli (Batsch) Ces. et De Not. Ad folia *Coryli avellanae* ad Hačava pr. Turňa nad B. Sloveniae merid.

Eurychora betulina (Fr.) Schröt. In convalli Divocká dolina pr. Zdounky in foliis *Betulae pendulae* (leg. Zavřel).

Melogramma spiniferum (Wallr.) De Not. Ad lignum *Fagi silvaticae* in colle Bučín ad Tetčice pr. Brno.

**Propolis rhodoleuca* (Sommft.) Fr. Ad strobilos *Pini silvestris* in colle Čebinka ad Tišnov.

Naemaeyclus niveus (Pers.) Sacc. In acubus *Pini austriaci* in colle Chochola ad Komín pr. Brno.

Stictis fimbriata Schwein. Ad strobilos *Pini silvestris* in colle Čebinka ad Tišnov, ad Rokytná pr. Mor. Krumlov.

Cenangium tiliaceum (Fr.) Karst. Ad ramos *Tiliae europaeae* ad arcem Veveří pr. Brno. Sporis 15·4 — 19·2 μ longis ac 4 μ latis, ascis 115 μ longis ac 9·6 μ latis.

Pyronema omphalodes (Bull.) Fuck. Humi in silva ad Březina propius flumen Říčka ad Brno, in silva ad Zadielská dolina pr. Horky Sloveniae merid.

**Peziza corium* Weber. Humi in silva quercina inter Tetčice et Kývalka pr. Brno.

***Helotium moravicum* Picbauer sp. n.**

Apotheciis 4—7 mm diam., singulatim sparsis, carnoso-coriaceis plus minusve patellaribus, stipitatis, hymenio brunneolis, extus ochraceis, stipite 3—8 mm longo, deorsum attenuato, similiter ac extus apotheciorum ochraceo praeditis. Ascis cylindraceo-clavatis, breviter stipitatis, octosporis; sporis oblique monostichis, oblonge ovoideis, continuis vel uni-biguttulatis, 15·5 — 22 μ (plerumque 19 μ) longis ac 7—7·7 μ latis, hyalinis; paraphysibus filiformibus.

Habitat ad ramulos carpineos decessos in declivi Čebinka ad Čebín prope Tišnov Moraviae. Mense martio ipse legi.

Pyrenopeziza nigra Picbauer sp. n.

Apotheciis hymenio denso, nigro insidentibus, gregariis, prominulis, $\frac{1}{8}$ — $\frac{1}{2}$ mm diam, membranaceis, patellaribus, basi contractis, extus nigris, intus plerumque nigris, rarius pallidioribus, siccis ore involuto et extus striatulis, margine plus minusve lacerato.

Ascis clavatis 70—80 μ longis ac 10—11 μ latis, poro apicali iodo tincto non coerulescente Sporis monostichis vel in superiore parte ascorum distichis, unicellularibus, protracte ovoideis, plerumque ad unum finem vel utrinque acutulis, 11·5—13 μ longis ac 5·5—6·4 μ latis. Paraphysibus ascos fere non superantibus, supra clavate incrassatis (usque 3 μ).

Habitat ad caules emortuos *Dipsaci silvestris* ad vicum Pouzdřany prope Hustopeče Moraviae merid. 4. VII. 1922 ipse legi ac 6. VII. 1922 in schedis ut *Pyrenopeziza nigra* sp. n. significavi.

Sclerotinia tuberosa (Hedw.) Fuck. Ad rhizomata *Anemonis nemorosae* ad Žďár na Mor. (leg. Baudyš).

**Lachnella barbata* (Kunze) Fr. Ad ramos *Lonicerae xylostei* ad molas Hadecký mlýn in convalli Říčka fluminis ad Brno, ad calcariam relictam ad Ochoz.

Stammaria equiseti (Hoffm.) Rehm. Ad folia *Equiseti ramosissimi* ad Hajnačka Sloveniae merid.

Fabraea ranunculi Karst. Ad folia *Ranunculi repentis* in convalli ad Zástřizly pr. Zdounky (leg. Zavřel).

Morehella hybrida (Sow.) Pers. Humi in aestatisilva Kolby ad Pouzdřany pr. Hustopeče, ad Horákov pr. Brno.

Morehella esculenta (L.) Pers. var. *vulgaris* sub salicibus in agris instituti nostri in Černá pole in Brno.

var. *fulva* Fr. loco graminoso ad Horákov pr. Brno. Locum indicavit dom. Fr. Švestka, etiam locum *Morchellae hybridae* ad Horákov.

Basidiomycetes.

Ustilaginales.

Ustilago Cordai Liro in ovariis *Polygoni hydropiperis* in silva Hulský les ad Kroměříž (leg. Zavřel).

Ustilago maior Schröt. In ovariis *Silenis otitis* var. *pseudootitis* ad Břeclav.

Ustilago lychnidis dioicae (D. C.) Liro. In antheris *Melandryi albi* ad Rakšice, stationen viae ferreae pr. Břeclav.

Ustilago violacea (Pers.) Tul. In antheris *Dianthi caryophylli* ad Břeclav copiosissime.

Ustilago oxalidis Ell. et Tr. In ovariis *Oxalidis strictae* in laterum ductu Medek ad Kroměříž (leg. Zavřel), in Blučina (leg. Baudyš).

* *Ustilago intermedia* Schröt. In antheris *Scabiosae lucidae* ad castellum venatorium ad Pustopolje pr. Dobšina Sloveniae.

Ustilago scabiosae (Sow.) Wint. In antheris *Knautiae arvensis* ad Milovice pr. Kroměříž (leg. Zavřel).

Ustilago ischaemi Fuck. In ovariis *Andropogonis ischaemi* ad Milovice pr. Kroměříž (leg. Zavřel).

* *Ustilago milii* (Fuck.) Liro. In foliis *Milli effusi* in hortis Zámecká zahrada in Kroměříž (leg. Zavřel).

Ustilago hypodytes (Schlecht.) Wint. In culmis *Triticici repentis* ad molas Podskalčí ad Troubsko pr. Brno.

Bromi erecti in prato ad Šelešovice pr. Kroměříž (leg. Zavřel).

Ustilago aculeata (Ule) Liro. In foliis *Triticici repentis* ad viam ad Borovina et ad Starč pr. Třebíč, in silva Wilsoni ad Brno.

Ustilago Salveii Berk. et Br. In foliis *Dactylidis glomeratae* in silva in colle Lysá hora ad Ochoz, in silva supra flumen Rokytná ad Rokytná pagum pr. Mor. Krumlov, ad Břeclav.

Ustilago panici glaucae (Wallr.) Wint. In ovariis *Setariae glaucae* ad Hrabětice pr. Znojmo.

Cintraetia carieis (Pers.) Magn. In ovaris *Caricis caryophylleae* in colle Leskoun ad Vedrovice pr. Mor. Krumlov, in colle Lysá hora ad Ochoz.

Schizonella melanogramma (D. C.) Schröt. In foliis *Caricis humilis* in colle Lysá hora ad Ochoz.

Caricis digitatae in colle Čebinka ad Tišnov.

Sorosporium dianthorum Ciff. In ovariis *Dianthi deltoidis* in convalli Nerešnice ad Zvoleň Sloveniae, ad sepulcrum ad Netín pr. Vel. Meziříčí.

Dianthi Carthusianorum in colle Chochola ad Komín pr. Brno.

Sorosporium cerastiorum Ciff. In ovariis *Cerastii arvensis* ad Kroměříž (leg. Zavřel), in colle Cimberk ad Kuřim pr. Brno.

Tolyposporium leptideum Syd. In ovariis *Chenopodii albi* ad Sct. Floriánek ad Mor. Krumlov, inter Pravlov et Dol. Kounice.

Tilletia decipiens (Pers.) Körn. In ovariis *Agrostidis vulgaris* in convalli Nerešnice ad Zvolen Sloveniae.

Entyloma linariae Schröt. In foliis *Linariae vulgaris* in convalli Bobravae fluminis pr. molas Anenský mlýn ad Ořechov pr. Brno.

Entyloma eryngii (Corda) D. B. In foliis *Eryngii campestris* ad Komín pr. Brno.

Entyloma serotinum Schröt. In foliis *Symphyti officinalis* ad Skržice pr. Zdounky (leg. Zavřel).

Tubercinia muscari (Niessl.) Liro. In antheris *Muscari comosi* ad molas Olšiny pr. Skržice ad Zdounky (leg. Zavřel).

Tubureinia colehiei (Schlecht.) Wint. In foliis *Colehiei autumnalis* in convalli Říčka fluminis ad mollas Hadecký mlýn pr. Ochoz.

**Tubureinia cortusae* Liro. In ovarii *Cortusae Matthioli* in monte Suchý in montibus Malá Fatra Sloveniae (leg. Dr. Krist). Adhuc a Naringol in Jaganus in Turkestan, ubi ab A. Regnel lecta est, nota.

Tubureinia anemones (Pers.) Liro. In foliis *Anemones nemorosae* in colle Lysá hora ad Ochoz pr. Brno; in silva Háje ad Zubří pr. Val. Meziříčí (leg. Dr. Krist).

Tubureinia pulsatillae Liro. In foliis *Pulsatillae grandis* in colle Malá Čebinka ad Tišnov, in planitie Zadielská planina ad Turňa n. B. Sloveniae merid.

Tubureinia agropyri (Preuss.) Liro. In foliis *Tritici repentis* in silva Wilsoni ad Brno.

Uredinales.

Hyalopsora polypodii (Pers.) Magn. Ad folia *Cystopteridis fragilis* in convalli Zadielská dolina ad Turňa n. B. Sloveniae merid.

Calyptospora Geoppertiana Kühn. In caulibus *Vaccinii vitis idaei* in silva ad viam turistorum Žižkova mohyla — Borová pr. Žďár n. Mor. (leg. Zavřel)

Thekopsora vacciniorum Karst. Ad folia *Vaccinii myrtilli* in silva ad Roštínská kaplička in collibus Chřiby (leg. Zavřel).

Thekopsora pirolae Gmel. Ad folia *Pirolae minoris* in silva infra colle Kleštětec in collibus Chřiby (leg. Zavřel).

Pucciniastrum circaeae (Thüm.) Schröt. Ad folia *Circaeae lute-tianae* in convalli Divocká dolina ad Zdounky (leg. Zavřel).

Melampsora Magnusiana Wagn. Ad folia *Corydalis cavae* et *digitatae* in silva ad Břest pr. Kroměříž (leg. Zavřel).

Melampsora allii-populina Kleb. Caeoma ad folia *Allii ursini* at Pouzdřany et Vranovice.

Cronartium ribicolum Diet. In cortice *Pini strobi* in horto instituti stultorum in Kroměříž (leg. Zavřel).

Endophyllum sempervivi (Alb. et Schw.) D. B. Ad folia *Sempervivi* sp. in montibus Predné Kopršády, in ascensu alpis Zadné Jatky in montibus Belanské Alpy (leg. Dr. Suza).

Coleosporium pulsatillae (Strauss) Lév. Ad folia *Pulsatillae grandis* in colle Chochola ad Komín, in colle Kamenný kopec ad Liskovec pr. Brno.

Uromyces geranii (D. C.) Otth. Ad folia *Geranii columbini* in convalli Nerešnice ad Zvoleň Sloveniae.

Uromyces airae flexuosae (Liro) Ferd. et Winge. In foliis *Airae flexuosae* ad viam a Tatranská Poljanka Velická dolina versus.

Uromyces ranunculi-festueae Jaap. Ad folia *Ranunculi bulbosi* in colle Čebinka ad Tišnov.

Uromyces graminis (Niessl) Diet. Aecidia ad folia *Seseli glauci* in planitie Zadielská planina ad Turňa n. B. Sloveniae merid.

Melicae ciliatae in colle Leskoun ad Vedrovice et in colle Křižák ad Mor. Krumlov.

Uromyces euphorbiae-corniculati Jordi. Ad folia *Loti corniculati* in colle Klucanina ad Tišnov (leg. Baudyš).

Uromyces caryophyllinus (Schrank) Schröt. Ad folia *Dianthi caryophylli* in Brno-V hlinkách.

Uromyces verruculosus Schröt. Ad folia *Melandryi albi* ad flumen Jihlavka ad Dol. Kounice et Pravlov.

Uromyces serophulariae (D. C.) Berk. et Br. Ad folia *Scrophulariae nodosae* in convalli Zadielská dolina ad Turňa n. B., in convalli Nerešnice ad Zvolen Sloveniae.

Uromyces thapsi (Opiz) Bub. Ad folia *Verbasci thapsi* ad pedes clivis Roháče ad Hajnačka Sloveniae merid.

Uromyces minor Schröt. Ad folia *Trifolii mantani* in planitie Zadielská planina ad Turňa n. B.

Uromyces ambiguus (D. C.) Fuck. Ad folia *Allii scorodoprasi* in colle Vejhon inter Blučina et Židlochovice.

**Uromyces erythronii* (D. C.) Pass. Ad folia *Erythronii dentis canis* supra pagum Brzotín ad Rožňava in planitie Silická planina Sloveniae merid (leg. Dr. Suza).

Uromyces genistae tinctoriae (Pers.) Wint. Ad folia *Cytisi nigricantis* in convalli Nerešnice ad Zvolen, in collibus Kováčské kopce ad Szob, in collibus Roháče ad Hajnačka, in Zadielská dolina et planina ad Turňa n. B.

Uromyces striolatus Tranzsch. Ad folia *Euphorbiae cyparissias* in colle Lysá hora ad Ochoz pr. Brno.

Uromyces gageae Peck. Ad folia *Gageae luteae* in hortis Květná zahrada in Kroměříž (leg. Zavřel).

Uromyces seillarum (Grev.) Wint. Ad folia *Muscari comosi* in colle Malá Čebínka ad Tišnov, ad Sct. Antonium ad Dol. Kounice, inter Dol. Kounice et Silůvky in agris.

Puccinia asparagi D. C. Ad folia *Asparagi officinalis* in agris ad Trboušany (leg. Ing. Šolc), in agris ad Kroměříž (leg. Zavřel), in agris ad Pravlov et Dol. Kounice.

Puccinia sweertiae (Opiz) Wint. Ad folia *Sweertiae perennis* in convalli Babilovská dolina in montibus Belanské alpy (leg. Dr. Suza).

Puccinia soldanellae (D. C.) Fuck. Ad folia *Soldanellae carpathicae* in Bednářský regl ad Žďár, inter Havran et Nový montes in montibus Belanské alpy (leg. Suza), ad speluncam gelidam ad convallem Zadielská dolina Sloveniae.

Puccinia asperulae odoratae Wurth. Ad folia *Asperulae odoratae* in silva in convalli supra pagum Zástřizly (leg. Zavřel).

Puccinia asperulae cynanchicae Wurth. Ad folia *Asperulae cynanchicae* in collibus Kováčské kopce ad Szob, in convalli Nerešnice ad Zvolen, ad Hajnačka, Filakovo, Zadielská dolina, Horky, Hajská dolina ad Turňa n. B., Moldava in Slovenia merid.

Puccinia asperulina (Juel.) Lgh. Ad folia *Asperulae tinctoriae* ad speluncam gelidam ad convallē Zadielská dolina pr. Turňa n. B.

Puccinia galii silvatici Otth. Ad folia *Galii silvatici* in convalli Nerešnice ad Zvolen, in convalli Zadielská et Hajská dolina ad Turňa n. B., ad Hačava, in collibus Kováčovské kopce Sloveniae merid.

Puccinia coëtanea Bub. Ad folia *Asperulae glaucae* in collibus Kováčovské kopce ad Szob, in convalli Nerešnice ad Zvolen Sloveniae.

Puccinia gentianae Strauss. Ad folia *Gentianae cruciatae* ad Jasov, in Miglincká pusta Sloveniae merid.

Puccinia cirsii eriophori Jacky. Ad folia *Cirsii eriophori* in Miglincká pusta ad Turňa n. B.

Puccinia retifera Lind. Ad folie *Chaerophylli bulbosi* in silva Plešovský les ad Kroměříž (leg. Zavřel).

Puccinia Barkhausiae rhoeadifoliae Bub. Ad folia *Crepidis rhoeadifoliae* ad Hajnačka pr. Filiakovo, ad Zadiel pr. Turňa n. B.

Puccinia coronata Corda Ad folia *Festuae giganteae* ad ruinam Nový hrad pr. Blansko.

Puccinia pygmaea Eriks. Ad folia *Calamagrostidis epigeios* in laterum ductu ad Vážany pr. Kroměříž (leg. Zavřel).

Puccinia arrhenatheri Kleb. Aecidia in foliis *Berberidis vulgaris* in hortis Zámecká zahrada in Kroměříž (leg. Zavřel).

Puccinia stipae (Opiz) Hora. Aecidia in foliis *Thymi Chamaedrydis* ad Sct. Antonium pr. Dol. Kounice.

Stipae capillatae in declivitate inter Dol. Kounice et Pravlov.

Puccinia anthoxanthi Fuck. Ad folia *Anthoxanthi odorati* in collibus Kováčovské kopce ad Szob, in convalli Nerešnice ad Zvolen, in planitie Zadielská planina ad Turňa n. B.

Puccinia pruni spinosae Pers. Ad folia *Pruni armeniacae* in horto in Kroměříž (leg. Zavřel).

Puccinia polygoni amphibii Pers. Ad folia *Geranii pratensis* ad piscinam pr. Rataje ad Kroměříž (leg. Zavřel).

Puccinia sessilis Schmidt. Ad folia *Convulariae maialis* in silva Hulský les ad Kroměříž (leg. Zavřel).

Puccinia Schmidtiana Diet. Ad folia *Leucoli aestivi* ad Mušov in pratis palustribus.

Puccinia melicae (Erick.) Syd. Ad folia *Melicae uniflorae* in convalli rivi a Vranov Lelekovice versus.

* *Puccinia ribesii-pseudocyperi* Kleb. Ad folia *Caricis pseudocyperi* in Hluboká dolina supra pagum Zástřizly ad Zdounky (leg. Zavřel).

Puccinia caricicola Fuck. Ad folia *Caricis supinae* in colle Leskoun ad Vedrovice pr. Mor. Krumlov.

Puccinia linosyridis-caricis E. Fisch. Ad folia *Asteris linosyridis* in planitie Zadielská planina ad Turňa n. B. Sloveniae.

Puccinia athamanthae (D C) Lind. Ad folia *Peucedani cervariae* in collibus Kováčovské kopce ad Szob, in convalli Nerešnice ad Zvolen, in planitie Zadielská planina, ad Jasov Sloveniae merid.

Puccinia bullata (Pers.) Wint. Ad folia *Seseli glauci* ad Horky pr. Turňa n. B.

Puccinia pyrethri Rbh. Ad folia *Chrysanthemi corymbosi* ad Dol. Kounice; ad Kováčov pr. Szob, in convalli Nerešnice ad Zvolen, in convalli Zadielská dolina et in planitie Zadielská planina ad Turňa n. B., ad Jasov Sloveniae merid

Puccinia chondrillina Syd. et Bub. Ad folia caulesque *Chondrillae iuncea* ad molas Olšiny pr. Skržnice ad Zdounky (leg. Zavřel), ad Dol. Kounice.

Puccinia carduorum Jacky. Ad folia *Cardui glauci* in faucibus Hrabušické rokle ad Kláštorisko pr. Spišská Nová Ves.

Puccinia echinopsis D. C. Ad folia *Echinopsis sphaerocephali* ad Hačava pr. Turňa n. B.

Puccinia absinthii D. C. Ad folia *Artemisiae absinthii* ad Sct. Antonium ad Dol. Kounice, ad Pravlov, in convalli Nerešnice ad Zvolen.

* *Puccinia Fuckelii* Syd. Ad folia *Jurineae mollis* ad ruinam arcis Čachtický hrad ad Nové Mesto n. V. (leg. Dr. Suza).

Puccinia carlinae Jacky. Ad folia *Carlinae acaulis* ad Cvrčovice pr. Zounky (leg. Zavřel).

Puccinia balsamitae (Strauss.) Wint. Ad folia *Tanaceti balsamitae* in Radostín ad Vel. Meziříčí (leg. Zavřel).

Puccinia tanaceti D. C. Ad folia *Tanaceti vulgaris* ad Velké Krštiany ad Něm. Pravno Sloveniae (leg. Baudyš).

Puccinia liliacearum Duby. Ad folia *Ornithogali umbellati* in hortis Květná zahrada in Kroměříž (leg. Zavřel).

* *Puccinia Loikaiana* Thüm. Ad folia *Ornithogali Boucheani* in hortis Květná zahrada in Kroměříž (leg. Zavřel).

Puccinia circaeae Pers. Ad folia *Circaeae lutetianae* in silva Břestský les ad Kroměříž (leg. Zavřel).

Puccinia De Baryana Thüm. Ad folia *Anemonis silvestris* in colle Velký Plešivec in collibus Čachtické kopce Sloveniae ovid. (leg. Suza), in Miglincká pusta ad Turňa n. B.

Puccinia salviae Ung. Ad folia *Salviae glutinosae* in convalli Zadielská et Hajská dolina ad Turňa n. B.

Puccinia asarina Kunz. Ad folia *Asari europaei* ad Horky pr. Zadielská dolina ad Turňa n. B.

Puccinia valantiae Pers. Ad folia *Galii verni* in collibus Roháče ad Hajnačka, in collibus ad Zadielská dolina Sloveniae.

Puccinia grisea (Strauss.) Wint. Ad folia *Globulariae Wilkommii* supra pagum Jalšová ad Piešťany Sloveniae acid. (leg. Suza).

Puccinia millefolii Fuck. Ad folia *Achilleae millefolii* in convalli Bobrave fluminis ad molas Annenský mlýn pr. Střelice ad Brno.

Puccinia artemisiicola Syd. Ad folia *Artemisiae campestris* ad Pravlov et Dol. Kounice.

Uropyxis sanguinea (Peck.) Arth. Ad folia *Mañoniae aquifoliae* in communi sepulcrorum loco in Kroměříž (leg. Zavřel).

Gymnosporangium iuniperinum (L.) Mart. Ad folia *Sorbi ariae* in planitie Zadielská planina ad Turňa n. B., in collibus Kováčovské kopce ad Szob Sloveniae.

Gymnosporangium iuniperi Link. Ad folia *Sorbi aucupariae* in planitie Zadielská planina et in convalli Nerešnice ad Zvolen.

Phragmidium tuberculatum J. Müll. Ad folia *Rosae rubiginosae* in colle Leskoun ad Vedrovice pr. Mor. Krumlov.

Phragmidium rosae alpinae (D. C.) Schröt. Ad folia *Rosae pendulinae* in convalli Zadielská dolina ad Turňa n. B.

Phragmidium pimpinellifoliae (Rbh.) Diet. Ad folia ramulosque *Rosae pimpinellifoliae* ad Rokytná pr. Mor. Krumlov.

Aecidium pulmonariae Thüm. Ad folia *Pulmonariae officinalis* in silva supra pagum Horky ad Zadielská dolina pr. Turňa n. B.

Hymenomycetes.

Exobasidium vaccinii (Fuck.) Wor. Ad folia *Vaccinii uliginosi* in prato sphagnali ad piscinam Velké Dářko pr. Žďár na Mor. (leg. Zavřel).

Auricularia auricula Iudae (L.) Schröt. Ad truncum *Sambuci nigrae* in hortis Lužánky in Brno.

Platyglöea nigricans Schröt. Ad ramos *Tiliae europaeae* in silva inter Týn et Okřešice ad Třebíč, ad arcem Veveří, pr. Brno.

Boletus strobilaceus Scop. In silva ad Tři křiže pr. Vev. Bytýška (leg. Baudyš), in silva promiscua ad arcem Nový Hrad pr. Blansko.

Boletus pulverulentus Opatow. In aestatisilva (*Carpinus*, *Quercus*, *Tilia*) ad molas Podskalčí ad Střelice pr. Brno mense iunio.

Schizophyllum commune Fr. Ad corticem *Laricis europaeae* et *Pini austriacae* in colle Chochola ad Komín pr. Brno.

Leptoglossum muscigenum (Bull.) Karst. Inter gramen et muscum in clivo Chochola ad Komín pr. Brno.

Lepiota rhacodes (Vitt.) Quél. Humi infra Robinias in colle Leskoun ad Vedrovice pr. Brno.

Astraeus stellatus Scop. Humi in declivitate Král. Stolice ad Znojmo.

Geaster coronatus (Schäff.) Schröt. In silva Šebrov ad Ochoz, ad Lelekovice, in convalli rivi Bílý potok inter Šmelcovna et Veverí Bitýška, ad Netín pr. Vel. Meziříčí Moraviae; in valle Černá voda Rakúská in Belanské Alpy (leg. Suza).

Geaster rufescens Pers. Humi in colle Čebinka ad Tišnov, in silva Střelický les ad Brno exeunte iunio.

Geaster fimbriatus Fr. In silva Šebrov ad Ochoz pr. Brno.

Geaster minimus Schw. Humi in colle Leskoun ad Vedrovice, in colle Křížák ad Mor. Krumlov, in colle Děvín in collibus Pavlovské kopce.

Geaster nanus Pers. Ad saxa permica in monte Křížák et ad Sct. Floriánek ad Mor. Krumlov, in colle Cimberk ad Kuřim, in declivitate Chochola ad Komín pr. Brno; in declivitate ad Vilíkov pr. Boskovice (leg. Dr. Krist).

Calvatia cyathiformis (Bosc.) Morg. In silva urbana inter Klentice et Pulgarov pr. Mikulov (leg. Moravek et Dr. Fröhlich), supra rivum Pocoucovský potok inter Třebíč et Ptáčov (leg. Zdeňka Picbauerová), ad Rokytná pr. Mor. Krumlov; in planitie Zadielská planina ad Turňa n. B. in communi excursione leg. Švestka.

* *Calvatia hungarica* Holl. Ad Ochoz pr. Brno.

* *Calvatia candida* (Rostk.) Holl. In margine agri ad Hrabětice pr. Znojmo, ad Rokytná pr. Mor. Krumlov, inter Dol. Kounice et Pravlov, inter Vel. Meziříčí et Moštiště, ad Troubsko pr. Brno.

Lycoperdon umbrinum Pers. In silvis inter Vranov et Lelekovice, ad Ochoz pr. Brno.

var. *stellare* Peck in declivitate inter Dol. Kounice et Pravlov.

Lycoperdon spadiceum Pers. Humi in clivo Chochola ad Komín pr. Brno, in declivitatibus ad Dol. Kounice et Ivančice, ad Mor. Krumlov.

Lycoperdon hiemale Vitt. In pascuis ad Netín pr. Vel. Meziříčí, ad Svinošice pr. Kuřim.

Lycoperdon pussillum Batsch. In declivitatibus ad Hlína, Troubsko, Střelice, Želešice, Malá Čebinka ad Tišnov.

Lycoperdon papillatum Schäff. In clivo Chochola ad Komín pr. Brno.

Lycoperdon furfuraceum Schäff. In colle Cimberk ad Kuřim, in colle Malá Čebinka et Čebinka ad Tišnov, in colle Křížák ad Mor. Krumlov.

Bovista nigrescens Pers. In alpi Bednářský regl pr. pagum Žďár in montibus Belanské Alpy (leg. Suza), in convalli Nerešnice ad Zvolen.

Disseiseda circumseissa Berk. et. Curt. In clivo Chochola ad Komín pr. Brno, ad molas Podskalčí ad Střelice pr. Brno, in convalli Bobrave fluminis ad Želešice lapidinas versus, in colle Leskoun ad Vedrovice pr. Mor. Krumlov, ad. Vel. Meziříčí.

Fungi imperfecti.

Phyllosticta atriplicis Desm. Ad folia *Atriplicis hastatae* in silva Plešovský les ad Kroměříž (leg. Zavřel).

* *Phyllosticta stomaticola* Baum. Ad folia *Arrhenatheri elatioris* ad Cvrčovice pr. Zdounky (leg. Zavřel)

Phyllosticta lacerans Pass. Ad folia *Ulmī laevis* in silva Plešovský les ad Kroměříž (leg. Zavřel).

* *Phyllosticta Nikolai* Bub. Ad folia *Melandryi albi* ad flumen Jihlavka inter Dol. Kounice et Pravlov.

Phyllosticta syringae West. Ad folia *Syringae vulgaris* in hortis in Kroměříž (leg. Zavřel).

* *Phoma chondrillae* Holl. Ad caules *Chondrillae iunceaе* inter Moštiště et Vel. Meziříčí.

Ascochyta Zavřelii Ignatii Picbauer sp. n.

Maculis utrinque visilibus, rotundatis vel ellipticis, solitariis vel confluentibus, brunneolis, medio arescentibus ac griseoalbis, circa medium arescentem obscuriore marginatis, locis macularum marginalibus dilutioribus. Pycnidiis plerumque epiphyllis, bene visilibus, brunneolis, 185-195 μ diam., poro ca 30 μ lato praeditis, circa porum obscurioribus.

Sporulis hyalinis unicellularibus, cylindraceis, utrinque rotundatis 5-7.7 μ longis ac 2.5 μ latis, bicellularibus cylindraceis, utrinque rotundatis, medio septatis, ad septa non vel leniter contractis, 8-9.6 (rarius usque 11.5) μ longis ac 3.5-4 μ latis.

Habitat ad folia viva *Onopordonis acanthium*. In vico Těšňovice prope oppidum Kroměříž prof. Hynek (Ignatius) Zavřel legit.

* *Septoria bromi* Sacc. Ad folia *Bromi mollis* in ripa fluminis Moravae ad Kroměříž (leg. Zavřel).

* *Septoria castanicola* Desm. Ad folia *Castaneae vescae* in silva ad Rakšice pr. Mor. Krumlov.

Septoria urticae Rob. et Desm. Ad folia *Urticae urentis* in Těšňovice pr. Kroměříž (leg. Zavřel), in Rakšice pr. Mor. Krumlov, in Hajnačka, Filakovo, Moldava et Dvorníky ad Turňa n. B.

Septoria oenanthis Picbauer sp. n.

Maculis utrinque visilibus, irregularibus, ochraceo pallide brunneolis, plerumque confluentibus et magnam partem foliorum

occupantibus. Pycnidiis epi- et hypophyllis, irregulariter disseminatis, subglobosis, brunneo-nigris, 90-120 μ diam., poro ca 37 μ lato apertis, contextu flavo-brunneo, parenchymatico; sporulis filiformibus, ad unum finem paulum attenuatis, non septatis, 23-27 μ longis ac 2.5 μ latis.

Habitat ad folia viva *Oenanthis aquaticae* in palude in silva ad vicum Chropyň prope Kroměříž. Ibi prof. Hynek Zavřel legit.

Septoria hepaticae Desm. Ad folia *Hepaticae trilobae* in colle Čebinka ad Tišnov.

Septoria menyanthis Desm. Ad folia *Menyanthis trifoliatae* in pratis inter Netín et Olší ad Vel Meziříčí.

Septoria astragali Desm. Ad folia *Astragali glycyphylly* in convalli Nerešnice ad Zvolen, in collibus Kováčské kopce ad Szob, in convalli Zadielská dolina et Hajska dolina ad Turňa n. B.

var. *santonensis* Brun. Ad folia *Astragali glycyphylly* ad pedes montis Slavkovský štít in montibus Tatrensibus.

Septoria oenotherae West. Ad folia *Oenotherae biennis* in ripa Morave fluminis ad Kroměříž (leg. Zavřel).

Septoria heraclei Fuck. Ad folia *Heraclei sphondylii* in fossa viae ferrae ad Šelešovice pr. Kroměříž (leg. Zavřel).

**Septoria aegopodina* Sacc. Ad folia *Pimpinellae saxifragae* in silva lucida ad Zadielská dolina pr. Turňa n. B.

**Septoria daucina* Brun. Ad folia *Dauci carotae* in horto in Kroměříž (leg. Zavřel).

Septoria convolvuli Desm. Ad folia *Convolvuli sepium* in ripa fluminis Moravae ad Trávník pr. Kroměříž (leg. Zavřel).

Septoria vincetoxici Sacc. Ad folia *Vincetoxici officinalis* in declivitate ad molas Olšiny pr. Skržice ad Zdounky (leg. Zavřel).

Septoria stachydis Rob. et Desm. Ad folia *Stachydis palustris* in convalli Divocká dolina ad Zdounky (leg. Zavřel), ad Nový Hrad pr. Blansko.

Septoria tanacetii Niessl. Ad folia *Tanacetii vulgaris* in ripa Moravae fluminis ad Kroměříž (leg. Zavřel).

Septoria cirsii Niessl. Ad folia *Cirsii oleracei* ad rivum Skržický potok pr. Zdounky (leg. Zavřel).

Hainesia Zavřelii Ignatii Picbauer sp. n.

Maculis amphivisilibus, subrotundatis, initio obscurius limitatis, deinde sine limitibus. Pycnidiis superficialibus, primo subglobosis ac clausis, deinde apertis cupulatisque, denique disciformibus, ceraceo-luteolis, sessilibus, 150-180 μ diam.; intus basidiis hyalinis, filiformibus usque 50-75 μ longis ac 1-1.5 μ latis expletis. Basidiis ramosis, apicibus monosporis.

Sporulis, hyalinis, apice ramulorum sessilibus, fusoideis usque subballantoideis, utrinque attenuatis, 5·3 - 10·5 μ longis ac 1·5 - 2·6 μ latis.

Habitat ad folia viva *Lythri salicariae* in ripa paludis „U strže“ ad Kroměříž Moraviae. 19. VIII. 1933 Hynek Zavřel legit. Species ad memoriam lectoris nominata.

Gloeosporium umbrinellum Berk. et Br. Ad folia *Quercus lanuginosae* ad Rokytňá pr. Mor. Krumlov.

* *Gloeosporium sanguisorbae* Fuck. Ad folia *Sanguisorbae officinalis* in pratis inter Vel. Meziříčí et Moštiště.

Marsonia Delastrei (De Lacr.) Sacc Ad folia *Viscaria vulgaris* in convalli Nerešnice ad Zvolen.

Marsonina moravica Picbauer sp. n.

Maculis orbicularibus saepe irregularibus, parvis, olivaceo-brunneolis, saepe ad apices foliorum dispositis. Acervulis punctiformibus, epidermide diu tectis, brunneolis. Sporulis cylindraceis, plus minusve pediformibus, utrinque ovato rotundatis, saepe uno loculo latiore alteroque angustiore, rectis vel paulum curvulis ad septa leniter constrictis, 10-13 (rarius 15) μ longis ac 3·5-4 μ latis, hyalinis usque paulum fumosiusculis; sporulis unicellariis duobus vel pluribus guttulis praeditis.

Habitat ad folia viva *Anemonis ranunculoidis* ad oppidum Kroměříž Moraviae plerumque in societate *Synchytrii anemonis*. Legit Hynek Zavřel.

Marsonia truncatula Sacc. Ad folia *Aceris campestre* ad Skrzice pr. Zdounky (leg. Zavřel).

Libertella faginea Desm. f. minor Sacc. In cortice *Carpini betuli* ad Nový Hrad pr. Blansko.

Stagonospora carpathica Bäum. = *Marsonia medicaginis* Voss. = *Aschochyta medicaginis* Bres. = *Stagonospora medicaginis* Bub. In foliis *Meliloti albi* in laterum ductu ad Vážany pr. Kroměříž (leg. Zavřel).

Botrytis parasitica Cav. Ad folia *Muscari comosi* in colle Malá Čebinka ad Tišnov.

* *Didymaria linariae* Pass. Ad folia *Linariae genistaefoliae* in convalli Nerešnice ad Zvolen.

Ramularia alismatis Fautrey. Ad folia *Alismatis plantaginis* in ripa paludis „U strže“ ad Kroměříž (leg. Zavřel).

Ramularia arvensis Sacc. Ad folia *Potentillae reptantis* ad Těšňovice pr. Kroměříž (leg. Zavřel).

* *Ramularia Winteri* Thüm. Ad folia *Ononidis hircinae* ad ascensum a domo turistorum in Zadielská dolina Hačava versus pr. Turňa n. B.

Ramularia oreophila Sacc. Ad folia *Astrantiae maioris* in silva infra collem Kleštěnek in collibus Chřiby (leg. Zavřel), in convalli Zadielská et Hajská dolina ad Turňa n. B.

Ramularia heraclei (Oud.) Sacc. Ad folia *Heraclei sphondylii* in convalli rivi Skržický potok ad Zdounky (leg. Zavřel).

Ramularia lysimachiae Thüm. Ad folia *Lysimachiae vulgaris* in ripa piscinae ad Rataje pr. Kroměříž (leg. Zavřel).

Ramularia cortusae Petr. Ad folia *Cortusae Matthioli* ad speluncam gelidam ad Zadielská dolina pr. Turňa n. B.

Ramularia anchusae Mass. Ad folia *Anchusae officinalis* ad Plešovec pr. Kroměříž (leg. Zavřel).

Ramularia aiugae (Niessl.) Sacc. Ad folia *Aiugae genevensis* in collibus Kováčské kopce ad Szob, in convalli Nerešnice ad Zvolen, in planitie Zadielská planina ad Turňa n. B.

Ramularia calcea (Desm.) Ces. Ad folia *Glechomatis federacei* ad piscinam ad Chropyn pr. Kroměříž (leg. Zavřel).

Ramularia marrubii Mass. Ad folia *Marrubii peregrini* ad introitum convallis Zadielská dolina ad Turňa n. B.

Ramularia leonuri Sorok. Ad folia *Leonuri cardiaci* in Šanov ad Znojmo.

Ramularia stachydis Mass. Ad folia *Stachydis annuae* in agris ad molas Olšiny pr. Skržice ad Zdounky (leg. Zavřel).

**Hormiscium hysterioides* Corda. Ad ramos *Tiliae cordatae* in silva Dubinky ad Okřešice pr. Třebíč.

Bispora monilioides Corda. In ligno *Fagi silvaticae* in colle Bučín ad Tetčice pr. Brno.

Fusieladium radiosum (Lib.) Lind. Ad folia *Populi albae* in declivitate Vejhon inter Blučina et Židlochovice.

Fusieladium orbiculatum (Desm.) Thüm. Ad folia *Sorbi torminalis* in silva Háje ad Šelešovice pr. Kroměříž, in silva in colle Kleštěnek in collibus Chřiby (leg. Zavřel).

Fusieladium heterosporum v. H. Ad folia *Epilobii hirsuti* ad Šelešovice pr. Kroměříž (leg. Zavřel).

Scolecotrichum fraxini Pass. Ad folia *Fraxini excelsioris* in silva Hulský les ad Kroměříž (leg. Zavřel).

Fraxini orni in collibus Kováčovské kopce ad Szob copiose.

Scolecotrichum compressum Allesch. Ad folia *Glyceriae fluitantis* ad piscinam pr. Rataje ad Kroměříž (leg. Zavřel).

Scolecotrichum graminis (Fuck.) Sacc. Ad folia *Alopecuri aequalis* in paludosis ad Morava flumen ad Trávník pr. Kroměříž (leg. Zavřel).

Cercospora dubia (Riess.) Wint. Ad folia *Chenopodii boni Hentici* in convalli Bobrava fluminis ad molas Anenský mlýn pr. Střelice ad Brno, ad Dol. Kounice.

Chenopodii albi in horto in Kroměříž (leg. Zavřel).

Chenopodii urticae in Popovice ad Kroměříž (leg. Zavřel).

Atriplicis patuli in horto in Kroměříž (leg. Zavřel).

Atriplicis hortensis in laterum ductu Medek ad Kroměříž (leg. Zavřel).

Cercospora mercurialis Pass. Ad folia *Mercurialis annuae* in horto in Kroměříž (leg. Zavřel).

Cercospora campi silii Speg. Ad folia *Impatietis nollii tangere* in convalli Divocká dolina ad Zdounky (leg. Zavřel).

Cercospora circumscissa Sacc. Ad folia *Pruni spinosae* ad Rakšice pr. Mor. Krumlov.

Alternaria tenuis Nees v. E. Ad folia *Saponariae officinalis* ad molas Olšiny pr. Skržice ad Zdounky (leg. Zavřel), ad Rakšice pr. Mor. Krumlov.

Uromyces roseum Mart. Ad thallum *Parmeliae saxatilis* in colle Leskoun ad Vedrovice pr. Mor. Krumlov.

**Fusarium pelargonii* Cr. Ad caules *Pelargonii zonalis* in caldariis firmae Vlk in Vel. Opatovice (leg. Baudyš).

Cerebella moravica Picbauer sp. n.

Stromatibus pulvinatis, cerebriformibus (tremellaceiformibus), thallo lichenis Synechoblasti vel Leptogii similibus, 2-5 mm diam., brunneo-atris Glomerulis globosis vel subglobosis, primo unicellularibus, deinde segmentatis ac e 2-5 segmentis compositis, 13-15.5 μ diam., rarius ovoideis, plerumque 23 μ longis ac 15.5 μ latis, brunneololuteis, ad septa plus minusve constrictis, levibus vel minute asperulis. Cellulis irregularibus a lateribus mutua pressione angulatis, supra convexis.

Habitat ad spicas vivas *Alopecuri aequalis* Sobol. ad oppidum Kroměříž Moraviae. Mense septembre profesor Ignatius Zavřel legit.

Sclerotium rhizodes Auerw. Ad folia *Brachypodii pinnati* in colle Vejhon inter Blučina et Židlochovice.

1600, New South

North America

P.S. 4

1600

1600

General, American, Manual

Books in USA

17.9

200

Publicatio sectionis phytopathologicae instituti agronomiei Brunae nr. 60.
Praefectus Doc. Dr. Ed. BAUDYŠ.

RICHARD PICBAUER :

Addenda ad floram Čechoslovakiae mycologicam III.

(Predloženo 9. II. 1927, vyšlo v dubnu 1927.)

Inventa horum Addendorum iterum ex parte propria, ex parte cl. doc. Dris. Ed. BAUDYŠ, qui benevolenter inventa sua mihi ad publicationem determinationemque commisit. Inventa sine nota territoriali ex Moravia oriuntur, bohémica ac slovenica praecipue signata sunt. Fungi a cl. Dre. E. BAUDYŠ lecti abbreviatione Bd, a me ipso lecti abbreviatione Pbr notati; fungi moravici ac silesiaci novi omnino LV ac tres species novae stella signati sunt.

Meum est praefecto meo cl. Dri. Doc. Ed. BAUDYŠ, qui studia mea magna cum intellectione prosecutus ac multum rarum fungum in patria nostra invenit eoque de studio mycologico in Moravia maxime meritus est, maximas gratias agere.

Myxomycetes.

Badhamia foliicola Lister. Ad folia *Brachypodii pinnati* in declivi Hornek supra convalle Řička pr. Brno (Bd).

Ad folia *Avenae pubescentis* eodem loco (Pbr).

Badhamia panicea (Fr.) Rost. Ad corticem *Populi* ad Bučovice (prof. Neuwirth).

Badhamia capsulifera (Bull.) Berk. Ad ramum decessum in declivitate Tichanov ad Heroltice pr. Tišnov (Pbr).

Physarum globuliferum (Bull.) Pers. Ad caules herbarum emortuorum ad Kuřim (legit prof. Dr. Hruby).

Physarum leucopus Link. Ad ramos quercuum in silva ad Topolčanky in montibus Inovec in Slovakia (leg. Dr. Hruby).

Physarum citrinum Schum. Ad muscos ad Jindřichův Hradec (leg. prof. Neuwirth), in silva Království dicta ad Grygov pr. Olomouc (Pbr).

**Physarum viride* (Bull.) Pers. Ad ramos in declivi Čebinka pr. Tišnov (Bd et Pbr), in declivi Hradisko ad Rožnov p. R. (Pbr).

Craterium leucocephalum (Pers.) Ditmar. Ad Lanškroun Bohemiae (Hruby).

Craterium minutum (Leers) Fr. In fastigio montis Králický Sněžník (Pbr).

Diachaea leucopoda (Bull.) Rost. Ad folia quercuum in declivi Hády pr. Brno (leg. Hruby).

**Didymium nigripes* Fr. Ad lignum putridum in silva Kříby ad Pavlov pr. Vel. Meziříčí (Pbr).

Didymium squamulosum (Alb. et Schw.) Fr. Ad fimum equestrem Brunae (leg. Dr. Hruby).

Didymium melanospermum (Pers.) Macbr. Ad molam Nový pr. Topolčany in montibus Inovec Slovakiae (leg. Dr. Hruby).

Mucilago spongiosa (Leysser) Morgan. In montibus Inovec circum Uhrad in Slovakia (leg. Hruby).

Stemonitis fusca Roth. Ad caudices putrescentes ad Grygov pr. Olomouc, ad Netín pr. Vel. Meziříčí (Pbr).

*var. *rufescens* Lister. In silva ad Adamov pr. Brno (leg. Dr. Suza).

**Stemonitis herbatica* Peck. Ad folia *Hieracii pilosellae* ad Jundrov pr. Brno (Pbr), in montibus Malé Karpaty (leg. Dr. Hruby).

Stemonitis splendens Rost. In silva mixta ad Uhrad pr. Topolčany in Slovakia (leg. Dr. Hruby), ad Jihlava, Netín (Pbr).

*var. *flaccida* Lister. Infra declivi Květnice dicto ad Tišnov (Pbr).

Stemonitis ferruginosa Ehrenberg. Ad caudices piceos ad Hutisko et in declivi Hradisko, pr. Rožnov p. Radh., ad Mouřinov pr. Bučovice (Pbr).

Stemonitis confluens Cooke et Ellis. Ad Vidnava in Silesia (leg. Dr. Hruby).

Comatriacha typhoides (Bull.) Lister. Ad Světlav pr. Bojkovice (Pbr).

Amaurochaete fuliginosa (Sow.) Macbr. Ad Netín pr. Vel. Meziříčí (Pbr).

Brefeldia maxima Rest. Ad Landškroun Bohemiae (leg. Dr. Hruby).

**Cribraria intricata* Schrader. Ad caudicem ad Netín pr. Vel. Meziříčí (Pbr).

Cribraria aurantiaca Schrad. In declivi Hradisko ad Rožnov p. R. et in silva Jedlovec dicta ad Netín (Pbr).

Dietydium cancellatum (Batsch) Macbr. In declivitatibus silvaticis circum Hutisko ad Rožnov p. R., ad Mourinov pr. Bučovice (Pbr).

var. *fuscum* Lister eodem loco (Pbr).

Reticularia Lycoperdon Bull. Ad Krěmaň pr. Olomouc (Pbr), Ostrý Kámen ad Svitavy (Tomala).

Trichia decipiens (Pers.) Macbr. Ad caudicem in convalli Pustý Žleb pr. Macocha locum praeruptum (Pbr), inter Frývaldov et Rejvíz in Silesia (leg. O. Mrkos).

Trichia varia Pers. Ad Bučovice, Vranovice, in convalli Chvojnice pr. Ketkovice ad Náměšť n. Osl., in silva ad Citov pr. Přerov (Pbr).

Trichia scabra Rost. Ad caudicem piceum inter Frývaldov et Rejvíz in Silesia (leg. O. Mrkos).

Trichia favoginea (Batsch) Pers. In declivitate ad Hutisko pr. Rožnov p. Radh. (leg. Pbr), in montibus Malé Karpaty (leg. Dr. Hruby).

Trichia affinis D. B. Ad Luhačovice (leg. O. Mrkos), ad vicinam Hutisko pr. Rožnov p. Radh., et in declivi Čebinka pr. Tišnov (Pbr).

Hemitrichia vesparium Macbr. Ad vicinam Hutisko et in declivitate Hradisko ad Rožnov p. R. (Pbr).

Arcyria ferruginea Sauter. In montibus Inovec ad Topolčany pr. molam Nový in Slovakia (leg. Dr. Hruby), ad Heroltice pr. Tišnov, ad Hutisko et Rožnov p. R. (Pbr).

Arcyria denudata (L.) Wettst. Loco Myší Díra dicto ad Outěchov pr. Brno (leg. Dr. Hruby), in declivitate Květnice pr. Tišnov, ad Zásoka pr. Vel. Meziříčí (Pbr).

**Arcyria globosa* Schwein. Ad ramos coryleos in declivitate Čebinka pr. Tišnov (Pbr).

Arcyria pomiformis (Leers) Rost. Ad ramum piceum in declivi Čebinka pr. Tišnov (Pbr).

Arcyria nutans (Bull.) Grev. In declivi Čebinka pr. Tišnov, ad Světlov pr. Bojkovice, in declivi Hradisko ad Rožnov p. R. (Pbr).

**Arcyria Oerstedtii* Rost. Ad caudicem pr. Macocha locum praeruptum (Pbr).

Arcyria cinerea (Bull.) Pers. In montibus Inovec ad Uhrad in Slovakia (leg. Dr. Hruby), ad Krěmaň pr. Olomouc, ad Světlov pr. Bojkovice (Pbr).

Phycomycetes.

Pycnochytrium succisae (D. B. et Woron.) Schröter. Ad folia viva *Succisae pratensis* loco dicto Nádvky ad Zásoka pr. Vel. Meziříčí (Pbr).

Urophlyctis pulposa (Wallr.) Schröt. In caulibus *Schizothecae hastatae* ad Něčice pr. Zdounky (Bd),

in caulibus *Chenopodii glauci* ad Tršice pr. Olomouc (Bd),

in caulibus *Schizothecae patulae* ad Němčice pr. Židlochovice (Pbr).

Albugo candida (Pers.) Kuntze. Ad folia viva *Armoraciae rusticanae* in Lesonice vicina ad Mor. Budějovice (Bd),

ad folia viva *Arabidis hirsutae* in convalli fluminis Bobravae pr. Brno (Pbr),

ad folia *Cardaminis amarae* ad Heroltice pr. Tišnov (Pbr),

ad folia viva *Raphani raphanistri* ad Lesonice (Bd).

Albugo tragopogonis (Pers.) S. F. Gray. Ad folia viva *Inulae britannicae* ad Těšany pr. Sokolnice (Bd).

Peronospora coronillae Gäum. Ad folia viva *Coronillae variae* in declivi Hornek ad Brno (Pbr).

Peronospora trivialis Gäum. Ad folia viva *Cerastii trivialis* ad vicinam Česká ad Brno et in convalli Říčka fluminis ad Brno (Bd).

Peronospora berteroe Gäum. Ad folia viva *Berteroe incanae* ad Maloměřice pr. Brno et ad molam Havlův pr. Tišnov (Bd), ad molam Kartouzský in convalli Bobravae fluminis ad Střelice (Pbr).

Peronospora nesleae Gäum. Ad folia viva *Nesleae paniculatae* ad Březina pr. Tišnov (Bd).

Peronospora chenopodii Glauci Gäum. Ad folia viva *Chenopodii glauci* ad hortos Lužánky Brunae (Bd).

Peronospora chenopodii Schlecht. Ad folia viva *Chenopodii hybridi* in Tišnov (Bd).

Peronospora viciae (Berk.) Gäum. Ad folia *Viciae hirsutae* pr. Jezdovice ad Třešť (Bd).

Peronospora Mayorii Gäum. Ad folia *Viciae segetalis* in agris ad Březina pr. Tišnov (Bd).

Peronospora candida Fuck. Ad folia *Anagalidis coeruleae* pr. Drásov, Čebín, Heroltice ad Tišnov (Bd et Pbr).

Peronospora asperuginis Schröt. Ad folia *Asperuginis procumbentis* in centrali sepulcrorum loco Brunae (Bd).

Peronospora symphyti Gäum. Ad folia *Symphyti tuberosi* in hortis urbanis in Mistek (Bd).

Peronospora sherardiae Fuck. Ad folia *Sherardiae arvensis* in agris ad Čebín et Tišnov (Bd et Pbr).

Peronospora boni Henrici Gäum. Ad folia *Chenopodii boni Henrici* in Březina (Pbr).

Peronospora saxifragae Bub. Ad folia *Saxifragae granulatae* ad Bobrava flumen pr. Střelice (Pbr).

Peronospora meliloti Syd. Ad folia *Meliloti dentati* ad Pouzdřany et Popice pr. Hustopeč (Pbr).

Peronospora crispula Fuck. Ad folia *Resedae luteolae* in Popice pr. Hustopeč (Pbr).

Peronospora brassicae Gäum. Ad folia *Brassicae oleraceae* in Židenice-Brno (leg. Matal).

Peronospora violaceae Berk. Ad flores *Knautiae arvensis* in pratis inter Březina et Tišnov (Pbr).

Peronospora leptosperma (D. B.) Gäum. Ad folia *Matricariae suaveolentis* in Uh. Hradiště (Bd et Pbr).

Basidiospora entospora Roze et Cornu. Ad folia *Erigerontis canadensis* in Černá pole ad Brno (Pbr).

Pseudoperonospora humuli Myabe et Takah. Ad folia viva *Humuli lupuli* ad Velký Týnec, Vacanovice, Krémaň, Majetín, Nelešovice, Suchonice ad Olomouc, ad Jenčice, Čekyně, Přestavky, Lipňany, Tršice, Kokořy ad Přerov, ad flumen Bečva pr. Lipník, Vigantice ad Rožnov p. R., Heroltice, Březina ad Tišnov; ad Dušníky n. V. in Bohemia (Bd); inter Žlutý kopec et silvam Wilsoni ad Brno (Pbr).

Sporodinia Aspergillus (Scop.) Schröt. ad *Gomphidium glutinosum* in Obora ad Vel. Opatovice, ad *Strobilomyces strobilaceum* in clivo Komín ad Heroltice pr. Tišnov, ad fungos varios ad Březina pr. Tišnov (Bd).

Entomophthora Aphidis Hoffm. Ad corpora *Macrosiphii Pisi* anno MCMXXVI in Moravia satis disseminata, praecipue inter Brno ac Hodonín, deinde locis urbi Znojmo propinquis, ita ad Bohonice, Rajhrad, Horní Heršpice, Blučina, Židlochovice, Hrušovany pr. Brno, Pohořelice, Mikulov, Zaječí, Hustopeč, Podivín, Kobyli, Karlín u Čejče, Mutěnice, Brumovice, Kyjov, Hodonín, Vel. Bilovice, deinde ad Dyjákovice, Miroslav, Vel. Bystřice ad Olomouc.

Advenit etiam ad corpora *Aphidarum* alliarum ad Brno.

Ascomycetes.

***Protomyces Kriegerianus** Büren. Ad folia viva *Leontodontis hispidi* ad Soběšice pr. Brno (Bd et Pbr), ad Borač pr. Tišnov (Bd); ad Kúty Slovakia occident. (Bd et Pbr).

Protomyces pachydermus Thüm. In foliis *Taraxaci officinalis* ad N. Lískovec et clivum Hády (Bd), ad Ochoz (Bd et Pbr), ad Nebovidy et Střelice (Pbr), ad Král. Pole et Česká (Bd et Pbr).

Taphrina insititiae (Sad.) Johans. Ad folia ramulosque *Prunus insititiae* ad Hutisko pr. Rožnov p. R. (Bd).

Taphrina Rostrupiana (Sad.) Giesenhagen. Ad fructus *Prunus spinosae* loco Kamenovská dicto ad Netín, pr. Vel. Meziříčí.

Elaphomyces cervinus (Pers.) Schröt. Ad rivum Havran in montibus Bielské Tatry Slovakiae septentr. (leg. Dr. Suza).

Elaphomyces variegatus Vitt. In clivo Dřínová apud Vohančice et in clivo Spálené Brdo ad Lažánky pr. Tišnov (Bd).

Sphaerotheca Humuli (D. C.) Burr. Ad folia *Xanthii spinosi* in Mutěnice (Pbr),

ad folia *Alchemillae arvensis* ad Vohančice pr. Tišnov (Bd).

Erysiphe Linkii Lev. Ad folia *Artemisiae vulgaris* ad Mušov pr. Mikulov (Pbr).

Erysiphe Cichoriacearum D. C. Ad folia *Galii aparinis* ad Mušov (Pbr).

Erysiphe Pisi D. C. Ad folia *Libanotidis montanae* inter Dol. Dujanovice et Guldenfurth pr. Mikulov (Pbr).

Tuber aestivum Vitt. Loco calcareo sub quercibus loco Spálené Brdo dicto pr. Heroltice ad Tišnov (leg. Opálka).

Chaetomium comatum (Tode) Fr. Ad culmos *Secalis cerealis* in Netín pr. Vel. Meziříčí (Pbr).

***Bombardia anserina** Rbh. In fimo anserino ad Němčice pr. Židlochovice (Pbr).

Colorea Chaetominum (Kunze) Rbh. Ad folia viva *Rubi idaei* ad Macocha locum praeruptum (Pbr).

Leptospora spermoides (Hoffm.) Fuck. Ad caudices in declivitate silvatica ad Heroltice pr. Tišnov (Pbr).

Herpotrichia nigra Hartig. Ad ramos foliaque *Pini pumilionis* in monte Vel. Rozsudec ad Těrchová, Slovakiae septentr. (Pbr).

Melanomma pulvis pyrius (Pers.) Fuck. Ad caudices *Carpini betuli* in convalli Pejškuvský potok infra declivitate Komín ad Heroltice pr. Tišnov (Bd).

Ceratostomella cirrhosa Pels. Sacc. Ad lignum caudidis putrescens ad Hutisko pr. Rožnov p. R. Peritheciis $650\ \mu$, ascis $61 \times 47.8\ \mu$, sporis $7.7-8 \times 3\ \mu$ (Pbr).

***Lentomita Auerswaldi** (Fleischhack) Sacc. Ad ramos emortuos *Geraniae tinctoriae* loco Kamenovská dicto ad Netín pr. Vel. Meziříčí (Pbr).

***Nitschkia cupularis** (Pers.) Karst. Ad ramos emortuos *Tiliae parviflorae* in Lipník n. B. (Bd).

Cucurbitaria spartii (Nees) Ces. et de Not. Ad ramos emortuos *Sarothamni vulgaris* ad Vostopovice pr. Brno et ad Netín p. Vel. Meziříčí (Pbr).

Lophiostoma insidiosum (Desm.) Ces. et de Not. Ad caules emortuos *Artemisiae campestris* in declivitate Čebinka ad Tišnov (Bd).

Guignardia astragalina Rehm. Ad folia *Astragali ciceris* in declivitate Johannesburg pr. Pratelbrunn ad Mikulov oppidum (Pbr). Ascis $71\ \mu$ longis ac $12.5\ \mu$ latis, sporis $10.7-12.5\ \mu$ longis ac $5.3-6\ \mu$ latis.

Lophiotrema vagabundum Sacc. Ad caules emortuos *Epilobii hirsuti* ad Světlav pr. Bojkovice (Pbr).

***Didymella Fuckeliana** Pass. (Sacc.) Ad caules emortuos *Epilobii hirsuti* ad Světlav pr. Bojkovice. Ascis $80-96 \times 6.4\ \mu$, sporis $12.8 \times 4.8\ \mu$, levissime constrictis (Pbr).

Stigmatea Robertiani Fr. Ad folia viva *Geranii Robertiani* ad Mohelno (Pbr).

***Metasphaeria arabidis** Johans. Ad folia flavescentia *Arabidis sagittatae* in declivitate Hornek supra convalli Říčka ad Brno (Bd et Pbr), ad Rožnov p. R. (Pbr).

Ophiobolus fruticum (Rob.) Sacc. Ad ramos *Ononidis spinosae* emortuos ad Nebovidy, molam Anenský pr. Střelice, ad Popice, pr. Hustopeč, ad Rožnov p. R., Vigantice, Bojkovice (Pbr).

Ophiobolus Cesatianus (Mont.) Sacc. Ad caules *Epilobii angustifolii* in silva Chudoba ad Okřešice pr. Třebíč (Pbr).

Ophiobolus porphyrogonus (Tode) Sacc. Ad caules *Verbasci* sp. ad Mohelno ad Iglaviam flumen (Pbr).

Leptosphaeria slovacica Piebauer sp. n.

Peritheciis nigris, subglobosis, glabris, non sulcatis, primo epidermide tectis, denique epidermide lacerata liberis, contextu paranchymatico brunneo, ca $277-375\ \mu$ diam., ostiolo praerupte inserto, usque $93\ \mu$ alto, rarius peritheciis in ostiolum protractis.

Ascis oblonge clavariaeformibus, infima parte angustissimis, superioreque parte latissimis, apiceque rotundatis, breviter stipitatis, $76-96\ \mu$ longis ac $5.3-7.7\ \mu$ latis.

Sporis inferiore parte mono-, superiore parte distichis, olivaceo-lutescentibus, fusiformibus, rectis vel paululo curvulis, ad unam diametrum crassioribus, ad fines attenuatis, triseptatis, ad septa constrictis, interdum non constrictis, $19-22\ \mu$ longis (rare usque $28\ \mu$), $4.8-5.5\ \mu$ latis.

Paraphysibus pluribus, filiformibus, sursum paululum crassioribus, hyalinis.

Habitat in caulibus *Ballotae nigrae* ad Bojkovice pr. Uh. Brod. 27. VI. 1926 ipse legi.

A *Leptosphaeria doliolum*, cui propinqua videtur, peritheciis non sulcatis, ascis ac sporis minoribus differt.

Pleospora dianthi De Not. Ad caules *Viscaria vulgaris* in declivitate a Troubsko meridionem versus pr. Brno (Pbr).

Pleospora salsolae Fuck. Ad caules *Salsolae kali* ad Hodonín (Pbr).

Pleospora herbarum Rbh. Ad caules *Linariae genistaeifoliae* in declivitate Hádý ad Brno. Ascis $128 \times 22\ \mu$, sporis $28-32 \times 18\ \mu$ (Pbr).

Pleospora ononidis Picbauer sp. n.

Peritheciis disseminatis, nigris, epidermide tectis et ostiolo solum prominulis, epidermide lacerata denique liberis, lentiformibus, siccis concavis, ostiolo papillaeformi praeditis, ea $468 \times 375\ \mu$ diam., perluxis contextu parenchymatico brunneo.

Ascis clavatis vel cylindraceis, omni loco fere aequaliter crassis, breviter stipitatis, 8 sporis, apice rotundatis, $115-130\ \mu$ longis (plurimis $115\ \mu$), $23-26\ \mu$ latis, membrana ea $3.2\ \mu$ crassa praeditis.

Sporis monostichis, solum subapicaliter semel distichis, adultis obscure lutescentibus, utrinque attenuate-rotundatis, transverse perfecte 5 septatis et in polis iterum imperfecte (intermissee) ac minus aperte semel septatis (quasi 7 septatis), in longum 1 septatis vel perfecte 1 septatis ac 1-2 (rare) imperfecte (intermissee) septatis.

Habitat in caulibus *Ononidis spinosae* in declivitate ad Pouzdřany pr. Hustopeč, in clivo Vejhon ad Blučina, in colle Děvín in Montibus Pavlovensibus, in declivitate Větrníky ad Dražovice pr. Vyškov. Ipse legi.

Species haec e propinquitate *Pleosporae herbarum* videtur. Differt, si dimensionum rationes habemus, ascis angustioribus sporisque pondere majore monostichis.

Pleospora infectoria Fuck. Ad culmos *Dactylidis glomeratae* ad Lipník n. B. (Bd).

***Pyrenophora comata** (Auersw. et Niessl) Sacc. Ad caules *Pulsatillae vulgaris* in declivitate Kamenný kopec pr. Liskovec ad Brno (Pbr).

***Diaporthe Winteri** Kunze. Ad caules *Ononidis spinosae* emortuos ad Kyničky pr. Brno (Pbr).

Diatrype disciformis (Hoffm.) Fr. Ad ramos *Fagi silvaticae* ad Hutisko p. R. (Pbr).

Melanconis stilbostoma (Fr.) Tul. Ad ramos *Betulae pendulae* ad Hutisko p. R. (Pbr).

Daldinia tuberosa (Scop.) Schröt. Ad caudicem *Aceris campestris* ad Vohančice pr. Tišnov (Bd).

Hercospora tiliae Fr. Ad ramos *Tiliae grandifoliae* ad stationem viae ferreae in Letovice (Bd).

Hypoxylon granulosum Bull. Ad ramos *Fagi silvaticae* emortuos in declivitate silvatica ad Hradisko pr. Rožnov p. R. (Pbr).

Phyllachora graminis (Pers.) Fuck. Ad folia *Festucae ovinae* ad margines silvae Bačkovce dictae ad Březina (Bd).

Phyllachora silvatica Sacc. et Speg. Ad folia *Festucae rubrae* in convalli rivi ad Žernoseky infra lapidinis phyllyticis pr. Železný Brod Bohemiae (Bd). Sporis $17-26 \times 9.6-11.5 \mu$, ascis $97 \times 15.4 \mu$. Est **Euryachora**, nam sporis-bicellularibus.

Euryachora thoracella Sacc. Ad caules *Sedi maximi* emortuos in ripa Oslavae fluminis dextra propius Valchà ad Náměšť n. O. (Bd).

Nectria punicea (Kunze et Schmidt) Fr. Ad ramum *Aesculi hippocastani* emortuum ad Netín (Bd).

Pleonectria ribis Karst. Ad ramos *Ribis sp.* in hortis urbanis in Mistek (Bd).

Hypomyces lateritius (Fr.) Tull. Ad *Lactarium deliciosum* ad Březina et Vohančice pr. Tišnov (Bd).

Claviceps purpurea Tull. In ovariis *Hordei distichi* ad Březina et Železné pr. Tišnov (Bd).

Triticici vulgaris ad Březina (Bd).

Hordei murini in Černá pole Brunae (Pbr).

Claviceps microcephala Wallr. In ovariis *Deschampsiae caespitosae* in declivitate Červený kopec dicta ad Jevíčko (Bd).

***Cordyceps clavulata** Ellis et Ewerh. Ad corpora *Lecanii corni* ad Vranovice (Pbr), ad Židlochovice (Ing. Farský).

Lophodermium melaleucum De Not. Ad folia *Vaccinii vitis idaeae* emortua ad Znetínek pr. Vel. Meziříčí (Pbr).

Heterosphaeria linariae (Rbh.) Hennings. Ad caules *Linariae genistaeifoliae* emortuos ad molam Skrejský pr. Náměšť n. O. (Pbr).

***Trochila Craterium** (D. C.) Fr. Ad folia flaccescentia *Hederae heliceis* in Černá pole Brunae (Pbr).

Rhytisma punctatum (Pers.) Fr. Ad folia *Aceris pseudoplatani* ad piscinam post castellum in Třešť (Bd).

Bactrospora dryina (Ach.) Mass. Ad corticem quercuum ad „Přivoz“ pr. Strážnice (leg. Suza).

Sarcosphaera coronaria Schröt. Humi in silva Wilsoni ad Brno (Pbr).

Ascophanus carneus (Pers.) Boud. Ad textum dejectum in Černá pole Brunae (Pbr).

Ascobolus stercorarius Bull. Ad fimum vaccinum inter Vohančice et Pejškov pr. Tišnov (Bd et Pbr).

Peziza macropus Pers. Ad Chudčice pr. Tišnov (leg. Šmarda).

***Saccobolus pseudoviolascens** Heimerl. Ad fimum cuniculorum in declivitate silvatica Hády dicta ad Brno (Pbr).

Sclerotinia baccarum Schröt. In fructibus *Vaccinii myrtilli* ad Netín et Znetínek pr. Vel. Meziříčí (Pbr).

Dasyscypha Bubakii Klika. In partibus superioribus convallis Demánovská dolina ad Vrbické pleso ad ramos *Pini pumilionis* Slovakiae (Suza).

Coryne sarcoides (Jacq.) Tull. Ad caudicem betulinum pr. Jihlava. Sporis $20-26 \times 4 \mu$, ascis $115 \times 7.7 \mu$, sporis usque 4 septatis (Pbr).

***Mollissia lignicola** Phil. Ad caudices pr. Mouřinov ad Bučovice (Pbr).

Fabraea ranunculi Karst. Ad folia viva *Ranunculi acris* ad Hlusovice pr. Olomouc (Pbr).

Ranunculi auricomi eodem loco (Pbr).

Ranunculi repentis ad Droždín pr. Olomouc (Pbr).

Ranunculi cassubici ad Krčmaň pr. Olomouc (Pbr).

Helvella lacunosa Afz. In silva Bačkovce Vohančice versus pr. Tišnov (Bd).

Basidiomycetes.

Ustilagineae.

Ustilago aculeata (Ule) Liro. In foliis *Agropyri repentis* ad viam inter Řečkovice et Česká ad Brno, ad viam inter Uh. Hradiště et Kunovice (Bd et Pbr).

Ustilago decipiens Liro. In ovariis *Arrhenatheri elatioris* ad Vigantice et in Rožnov p. R., in declivitate Hornek supra convalli Řičkae fluminis ad Brno (Bd et Pbr).

Ustilago striaeformis (West.) Niessl. In foliis vivis *Agrostidis albae* ad viam inter Březina et Vohančice pr. Tišnov (Bd).

**Ustilago brizae* (Ule) Liro. In culmo *Brizae mediae* ad Netín, pr. Vel. Meziříčí (Pbr).

Ustilago hypodytes (Schlecht.) Fr. Ad culmos *Agropyri glaucae* in declivitatibus ad Žbánice pr. Mor. Krumlov (Bd), in clivo Kraví hora pr. Brno (Pbr).

Ustilago panici glaucae Winter. In ovariis *Panici glaucae* inter Radošovice et Střelice pr. Brno (Pbr), ad Veverí Bitýška (Pbr et Bd).

Ustilago panici milliacei (Pers.) Winter. In ovariis *Panici milliacei* ad Chudčice, pr. Tišnov (Bd et Pbr).

**Ustilago stygia* Liro. In ovariis *Rumicis acetosae* in pratis ad Hutisko, pr. Rožnov p. R. (Pbr).

Ustilago carnea Liro. In ovariis *Polygoni convolvuli* ad Mohelno (Pbr), in convalli rivi Pejškovensis ad Heroltice et in Vlčí doly ad Hradčany pr. Tišnov (Bd).

Ustilago reticulata Liro. In ovariis *Polygoni lapathifolii* ad Veverí Bitýška (Bd et Pbr), ad Hradčany pr. Tišnov (Bd).

Polygoni persicariae in pratis „V Úzkých“ dictis ad Tišnov et ad Březina (Bd).

Polygoni tomentosi ad Nový Lískovec et in Lipník n. B. (Bd).

Ustilago major Schröt. In ovariis *Silenis otitis* in declivitate Hády ad Brno (Bd et Pbr), ad Žbánice pr. Mor. Krumlov (Bd).

Ustilago violacea (Pers.) Roussel. In antheris *Saponariae officinalis* in ripa Svratkae fluminis ad Tišnov (Bd).

Dianthi Pontenderae in declivitatibus ad Mohelno (Pbr).

Ustilago lychnidis dioicae Liro. In antheris *Melandryi albi* ad Rožnov p. R. et ad Kunovice pr. Uh. Hradiště (Bd et Pbr).

Ustilago oxalidis Ell. et Tracy. In ovariis *Oxalidis strictae* ad Tišnov et Zborovice (leg. Ing. Kalandra), in vico a statione viae ferreae

ad communem sepulcrorum locum in Lipník n. B. (Bd), in horto botanico scholae agronomicae Brunae (Pbr).

Ustilago scabiosae (Sow.) Winter. In antheris *Knautiae arvensis* ad viam inter stationem Hradčany et Březina vicinam (Bd), in pratis inter Březina et Tišnov (Pbr), ad Mohelno, pr. Vostopovice ad Brno (Pbr), ad Hutisko pr. Rožnov p. R. (Bd et Pbr).

Knautiae silvaticae ad molam Anenský pr. Střelice (Pbr).

Sphacelotheca hydropiperis (Schum.) D. B. In ovariis *Polygoni hydropiperis* ad Mohelno (Pbr).

Anthracoidea caricis Bref. In ovariis *Caricis glaucae* ad Světlov pr. Bojkovice (Bd et Pbr).

Caricis sempervirentis in monte Choč, Slovakia (Klika).

***Cintractia luzuleae** (Sacc.) Clinton. In ovariis *Luzulae pilosae* Willd. in hortis urbanis ad ripam Bečvae fluminis in Rožnov p. R. et in declivitate supra serra in Solanec ad Rožnov p. R. (Bd), in silva „Ve Žlebě“ ad Úsobrno pr. Jevíčko (leg. Ing. Kalandra), in silva Jedlovce et Boroviny ad Netín pr. Vel. Meziříčí (Pbr).

Schizonella melanogramma (D. C.) Schröt. In foliis *Caricis digitatae* in silva Strážnice ad Netín (Pbr).

Sorosporium saponariae Rud. In ovariis *Cerastii arvensis* in ripa Svratkae fl. inter Březina et Heroltice ad Tišnov et in loco exercitationis infra Klajdovka ad Brno (Bd).

Stellariae holostee in Vlčí doly pr. Hradčany ad Tišnov (Bd), in silvis inter Střelice et molam Anenský pr. Brno (Pbr).

Dianthi deltoideis ad Drahonín pr. Tišnov (Bd), ad Netín et Dědkov pr. Vel. Meziříčí (Pbr).

Dianthi Pontenderae in declivitatibus ad Mohelno (Pbr).

Tolyposporium junci (Schröt.) Woron. In ovariis *Junci bufonii* ad Střelice pr. Brno (Pbr).

Tilletia decipiens (Pers.) Körn. In ovariis *Agrostidis vulgaris* in declivitate Dálka ad Čebín (Bd) et inter Vohančice et Pejškov ad Tišnov (Bd et Pbr), in declivitate Kamenný kopec ad Nový Lískovec pr. Brno, ad Strážnice clivum pr. Netín et ad Dědkov pr. Vel. Meziříčí (Pbr).

Tilletia separata Kunze. In ovariis *Agrostidis spicae venti* ad Dědkov pr. Vel. Meziříčí (Pbr).

Entyloma linariae Schröt. In foliis *Linariae vulgaris* in declivitate Červený kopec ad Jevíčko (Bd).

Entyloma canescens Schröt. In foliis *Myosotidis intermediae* ad Sct. Antoníček pr. Brno (Pbr).

Entyloma serotinum Schröt. In foliis *Symphyti officinalis* in agris ad Královo Pole pr. Brno (Bd et Pbr).

Entyloma calendulae (Oud.) D. B. In foliis *Calendulae officinalis* ad Lipník n. B. (Bd).

***Entyloma erigerontis** Syd. In foliis *Erigerontis acris* in declivitate Červený kopec ad Jevíčko et in convalli Šumná Děsná fl. ad Kouty (Bd).

Entyloma eryngii D. B. In foliis *Eryngii campestris* ad Třebíč (Pbr), ad Březina pr. Tišnov (Bd).

***Entyloma dahliae** Syd. In foliis *Dahliae variabilis* in hortis domini Dokoupil in Vel. Opatovice (leg. Dokoupil) et in hortis castellanis eodem loco (Bd).

Tubercinia agropyri (Reuss.) Liro. In foliis *Triticum repens* ad viam e Uh. Hradiště Kunovice versus (Bd et Pbr), ad Hradčany, inter Doubravnik et Borač ad Tišnov, ad centalem sepulcrorum locum Brunae (Bd).

Tubercinia ranunculi (Lib.) Liro. Ad folia *Ranunculi repens* in convalli rivi holasicensis ad Tišnov, in Lipník n. B. (Bd).

Tubercinia Fischeri (Körn.) Liro. Ad folia *Caricis Goudenoughii* ad viam in pratis ad Hutisko p. R. (Bd).

Tubercinia Junci (Lgh.) Liro. Ad folia *Junci filiformis* in pratis ad Netín et Znetínek pr. Vel. Meziříčí (Pbr).

Uredinales.

Uredinopsis filicina (Niessl.) Magn. Ad folia *Phegopteridis polypodioidis* in silvis ad Hutisko et Solanec pr. Rožnov p. R. (Pbr).

Melampsorella caryophylleacearum (D. C.) Schröt. Ad folia *Stellariae holostea* in convalli Svratkae fluminis ad Veverí Bítýška (Bd).

Melampsora galanthi-fragilis Kleb. Caeomata in foliis *Galanthi nivalis* infra declivitate Hornek in convalli Říčské fluminis ad Brno (leg. Švestka).

Melampsora euphorbiae Gerardianae W. Müller. Ad folia *Euphorbiae falcatae* in agris ad Čebín pr. Tišnov (Bd et Pbr).

Thekopsora areolata (Wallr.) Magn. Ad squammas *Piceae excelsae* in silva Peklo dicta ad Olší pr. Vel. Meziříčí (Pbr).

Coleosporium pulsatillae (Strauss) Lév. Ad folia *Pulsatillae vulgaris* in declivitatibus a Čebín vicina meridionem versus pr. Tišnov (Pbr et Bd).

**Coleosporium Martianooffianum* Syd. Ad folia *Delphinii elatioris* in horto botanico scholae agronomicae Brunae (Kalandra et Pbr). Adhuc e Siberia solum notum.

Coleosporium senecionis (Pers.) Fr. Ceomata in foliis *Pini silvestris* ad margines silvae in declivitate Juránka ad Brno (Pbr).

Endophyllum sempervivi Lév. Ad folia *Sempervivi soboliferi* in convalli Libušino údolí ad Třebíč (leg. Suza).

Sempervivi montani in colle Sitno, ad lacus na Volovci, in monte Dumbír Slovakiae (leg. Suza).

Endophyllum euphorbiae silvaticae (D. C.) Wint. Ad folia *Euphorbiae amygdaloidis* in monte Malý Kriváň in montibus Fatra dictis Slovakiae (leg. Dr. Suza).

Gymnosporangium clavariaeforme (Jacq.) D. C. Ad folia *Crataegi oxyacanthae* in Piešťany Slovakiae (leg. Fuksa).

Phragmidium tuberculatum J. Müll. Ad folia *Rosae rubiginosae* in declivitate Květnice ad Tišnov (Bd et Pbr), in silva Wilsoni et ad Kohoutovice et Bohonice pr. Brno (Pbr).

Triphragmium ulmariae (Schum.) Winter. Ad folia *Filipendulae ulmariae* in convalli Říčka fluminis ad Brno (leg. Dr. Hruby).

**Triphragmium filipendulae* Lasch. Ad folia *Filipendulae vulgaris* in declivitatibus serpentinis ad Mohelno (Pbr).

Uromyces ervi (Wallr.) Plowr. Ad folia caulesque *Ervi hirsuti* ad Lipník, infra mola Hadlov pr. Drahonin ad Pernštýn (Bd).

Uromyces phaseoli Wint. Ad folia *Phaseoli vulgaris* in Višňová ad Mor. Krumlov (Bd).

Uromyces geranii (D. C.) Otth. et Warth. Ad folia *Geranii dissecti* in silva Wilsoni ad Brno (Pbr).

Uromyces astragali (Opiz) Sacc. Ad folia *Astragali glycyphylli* ad Troubsko et Střelice (Pbr).

Astragali narbonensis in horto botanico scholae agronomicae Brunae (Pbr).

Uromyces striatus Schröt. Ad folia *Trifolii arvensis* in clivo Horka ad Březina pr. Tišnov (Bd).

Uromyces anthyllidis (Grev.) Schröt. Ad folia *Anthyllidis vulneariae* ad Březina (Bd).

Uromyces flectens Lgh. Ad folia *Trifolii repentis* in pratis „V široké“ dictis ad Tišnov (Bd).

Uromyces ornithogali (Wallr.) Lév. Ad folia *Gageae minimae* ad Hlubočany pr. Vyškov (Pbr).

Uromyces gageae Beek. Ad folia *Gageae luteae* in hortis urbanis in Mistek (Bd).

Uromyces scutellatus (Schrank) Lév. Ad folia *Euphorbiae cyparissialis* ad Klimkovicé in Silesia, in monte Kotouč ad Štramberk, in declivitatibus Říčské fluminis ad Ochoz pr. Brno; ad Sulov Slovakiae oecid. (Pbr).

Puccinia asperulae cynanchicae Wurth. Ad folia *Asperulae cynanchicae* ad Holasice pr. Tišnov (Bd).

Puccinia punctata Link. Ad folia *Galii Wirtgeni* in clivo Schafberg ad Horní Vistonice pr. Mikulov (Pbr).

Puccinia menthae Pers. Ad folia *Calamithae acinos* in declivitate Hády ad Brno (Bd).

Puccinia nigrescens Kirch. Ad folia *Salviae verticillatae* ad Doubravnik pr. Tišnov (Bd).

Puccinia chaerophylli Purt. Ad folia *Chaerophylli silvestris* ad Bojkovice (Pbr).

Puccinia aromatica Bub. Ad folia *Chaerophylli aromatici* in clivo Hradisko ad Rožnov p. R. (Bd et Pbr).

Puccinia retifera Lindr. Ad folia *Chaerophylli bulbosi* ad Nivnice pr. U. Brod (Bd).

Puccinia glumarum Eriks. et Hennings. Ad folia *Tritici repentis* ad Maloměřice pr. Brno (Bd).

Puccinia graminis Pers. Ad folia *Deschampsiae caespitosae* inter Smolná et Jevíčko (Bd).

Tritici intermedi ad Mohelno (Pbr).

Tritici canini ad Bojkovice (Pbr).

Calamagrostidis epigeos ad Mohelno (Pbr).

Poa trivialis in Pisárky pr. Brno (Pbr).

Puccinia perplexans Plowr. Ad folia *Alopecuri pratensis* ad Netín (Pbr).

Puccinia coronata Corda. Ad folia *Phalaridis arundinaceae* ad Mohelno (Pbr).

Puccinia lolii Niels. Ad folia *Glyceriae aquaticae* ad molam Podskalčí pr. Střelice (Pbr).

Holci lanati ad Jevíčko (Bd).

Puccinia melicae Eriks. Ad folia *Melicae nutantis* ad Macocha locum praeruptum (Pbr).

Puccinia agrostidis Plowr. Aecidia ad folia *Aquilegiae vulgaris* in silvaticis ad Bojkovice et Banov (Pbr).

Puccinia sesleriae Reich. Ad folia *Sesleriae calcareae* in clivo Čebinka pr. Tišnov (Pbr).

Puccinia Traillii Plowr. Ad folia *Phragmitis communis* ad Mušov pr. Mikulov (Pbr).

Puccinia Opizii Bub. Aecidia ad folia *Lampsanae communis* ad molam Trouznický pr. Znojmo (Pbr).

Teleutosporae ad folia *Caricis muricatae* in declivitate Tichanov ad Heroltice pr. Tišnov, ad Bilovice n. Sv. (Pbr).

Puccinia silvatica Schröt. Aecidia ad folia *Orepidis biennis* in monte Kotouč ad Štramberk (Pbr).

Puccinia iridis Wallr. Ad folia *Iridis pumilae* in declivitatibus ad Pouzdřany pr. Hustopeč (Pbr).

Puccinia Čelakovskýana Bub. Ad folia *Galii cruciatae* in convalli Svratkae fluminis ad Holasice et Veverí Bitýška satis disseminata (Pbr et Bd), ad Mohelno (Pbr).

Puccinia pulsatillae (Opiz) Rostr. Ad folia *Pulsatillae vulgaris* in Kamenný kopec ad Nový Lískovec pr. Brno (Pbr).

Puccinia millefolii Fuck. Ad folia *Achilleae millefolii* ad Troubsko pr. Brno (Pbr).

Puccinia annularis (Strauss) Wint. Ad folia *Teucrii chamaedrys* ad silvam Bačkovce pr. Březina ad Tišnov (Bd).

Puccinia arenariae (Schum.) Wint. Ad folia *Agrostemmae githaginis* in declivitate Červený kopec ad Jevíčko (Bd).

Auriculariineae.

Platyglloe nigricans Schröt. Ad ramos *Tiliae* deiectos in hortis in supra Železný Brod et ad Gotthardt pr. Hořice sub montibus Corconticis Bohemiae; ad piscinam pr. Jezdovice ad Třešť (Bd), in hortis urbanis in Rožnov p. R. (Bd et Pbr), ad Závist et molam Červený pr. Tišnov (Pbr), in Lipník n. B. (Bd).

Tremellineae.

Tremellodon gelatinosum Scop. Ad caudicem pinastrem in Vlčí dolý ad Hradčany pr. Tišnov (Bd).

Exobasidiineae.

***Exobasidium oxycocci** Rostr. Ad folia *Vaccinii oxycocci* ad Moosebruch pr. Rejvív in Silesia (leg. O. Mrkos).

Exobasidium Vaccinii (Fuck.) Woron. Ad folia *Vaccinii vitis idaeae* ad Volovec in montibus Liptavské Hole (Klika); ad Znetínek pr. Vel. Meziříčí (Pbr).

Hymenomycetinae.

***Dendrothele griseocana** Bresad. Ad *Salicem fragilem* ad molam Červený pr. Tišnov (Bd, det. Pilát).

Peniophora sanguinea H. et L. Ad caudicem pinastrem in clivo Čebínka pr. Tišnov (Bd et Pilát).

Aleurodiscus amorphus (Pers.) Rbh. Ad ramos piceos ad Hrubá Voda pr. Olomouc, ad ramos abietinos ad Rantířov pr. Jihlava (Pbr).

Thelephora palmata (Scop.) Fr. Humi in silvis ad Vohančice (Bd), ad Pejškov, Lažánky, Březina et Tišnov (Bd et Pbr).

Cyphella villosa Karst. Ad caules emortuos *Ononidis spinosae* ad Světlov pr. Bojkovice, ad Popice pr. Hustopeč, ad Nebovidy pr. Brno (Pbr).

Phaeodon aurantiacus (Batsch.) Schröt. In silvis inter Závist et Březina (Bd et Pbr), ad Příseka pr. Jihlava (Pbr).

Hydnum cyathiforme Schäffer. Ad Vohančice pr. Tišnov (Bd).

Hydnum rufescens Pers. In silvis ad Vohančice (Bd).

Hydnum compactum Pers. In silvis inter Závist et Březina (Bd et Pbr).

Radulum quercinum (Pers.) Fr. Ad ramum quercinum in declivitate Tichanov ad Heroltice pr. Tišnov (Pbr).

Merulius tremellosus Schrad. Ad caudices in clivo Čebínka ad Tišnov (Pbr).

Polyporus elegans (Bull.) Fr. In clivo Kraví hora ad Ketkovice pr. Náměšť n. O. (Pbr).

Polyporus amorphus Fr. Ad caudicem pinastrem in clivo Čebínka ad Tišnov (Pbr).

Polyporus arcularius (Batsch.) Fr. Ad ramos *Rosae caninae* decessos in silva ad Žebětín pr. Brno (Pbr).

Polyporus picipes Fr. In silva betulina ad Netín pr. Vel. Meziříčí et ad Příseka pr. Jihlava (Pbr).

Polyporus cristatus Pers. Humi in silvis inter Závist et Březina (Bd et Pbr) et in silvis a Lažánky ad septentr. versus pr. Tišnov (Bd).

Polyporus ovinus Schäff. Ad Březina (Bd).

Polyporus unbellatus Fr. In silva Jedlovec ad Netín (Pbr).

Polyporus lucidus Leyss. Ad Březina (Bd).

**Polyporus roburneus* Quél. Ad *Quercum Cerris* ad Lednice (leg. Valoušek, det. A. Pilát).

Trametes suaveolens (L.) Fr. Ad salices ad Březina (Bd).

Boletus regius Krombh. In declivitate silvatica pr. Lažánky ad Tišnov (leg. atque determ. Bd ipse). Vidi exemplares siccos solum.

Boletus purpureus Fr. In silva „Na Výrovce“ dicta ad Tišnov (leg. atque determ. Bd ipse). Vidi exemplares siccos solum.

Strobilomyces strobilaceus (Scop.) Berk. In convalli rivi Pejškovensis infra clivo Komin (Bd) et in clivo Tichanov ad Heroltice pr. Tišnov (Pbr).

Lepiota gracilentia Krombh. In silva ad Vel. Opatovice (Bd), in silva Bačkovce ad Březina pr. Tišnov (Bd et Pbr).

Schizophyllum commune Fr. Ad truncum coniferinum ad Tišnov (Pbr).

Phallus inpudivus L. In silvis ad Heroltice et Lažánky pr. Tišnov (Bd et Pbr).

Gautiera graveolens Vitt. Humi in silva coniferina ad Střelice convallem Bobravae fluminis versus (leg. Zdenka Picbauerová).

Hysterangium clathroides Vitt. Eodem loco (leg. Zdenka Picbauerová).

Rhizopogon luteolus Fr. In declivitatibus silvaticis ad rivum Pejškovensem et in clivo Strážná ad Vohančice, in silva „Na Výrovce“ ad Tišnov (Bd).

Rhizopogon aestivus Wulf. In clivo Dřínová ad Vohančice (Bd), in silva ad Střelice (Pbr).

Scleroderma Bovista Fr. In agris supra molam Nový inter Náměšt n. O. et Jedov (Bd).

Astraeus stellatus Scop. Fisch. Ad molam Podskalčí pr. Střelice (Pbr).

Geaster pectinatus Pers. In clivo Čebinka ad Tišnov (Bd et Pbr), ad Mohelno (Pbr), Zelená hora ad Mohelno (leg. Dvořák).

Geaster fimbriatus Fr. In clivo Strážná et Bačkovce ad Vohančice (Bd), ad Závist pr. Tišnov (Pbr), in convalli fluminis Bobravae ad Střelice; ad Sulov Slovakiae occid. (Pbr).

Geaster coronatus (Schäff.) Schröt. In convalli Oslavae fluminis ad Čučice (leg. Dr. Suza).

Crucibulum vulgare Tull. In silva Bačkovce ad Vohančice (Bd).

Lycoperdon spadiceum Pers. Ad Mohelno (Pbr).

Fungi imperfecti.

Phyllosticta cirsii Desm. Ad folia *Cirsii arvensis* in Černá pole ad Brno (Pbr).

**Phyllosticta lacerans* Paser. Ad folia *Ulm*i sp. ad Macocha locum praeruptum (Pbr).

**Phyllosticta praetervisa* Bub. Ad folia *Tiliae cordatae* ad Královo Pole pr. Brno (Bd).

**Phyllosticta nebulosa* Sacc. Ad folia *Melandryi noctiflori* in declivitate Červený kopec ad Jevíčko (Bd).

Phyllosticta eryngii Rom. Ad folia *Eryngii campestris* ad Jinošov pr. Náměšť n. Osl. (Bd). Spor. 10—14 $\mu \times 2 \mu$.

Phoma acuta Fuck. Ad caules *Scrophulariae nodosae* ad Ketkovic pr. Náměšť n. O. (Pbr).

Phoma vulgaris Sacc. Ad caules *Medicaginis sativae* ad centralem sepulcrorum locum Brunae et ad Uh. Hradiště (Bd).

**Phoma diversispora* Bub. Ad legumina *Phaseoli vulgaris* Brunae (Bd et Pbr).

Phoma Zopfiana Allesch. Ad caules *Ononidis spinosae* ad Hovorany pr. Hodonín (Pbr).

**Phomopsis cytisi* (P. Henn.) Died. Ad ramos *Cytisi Kitaibelii* ad Pouzdřany pr. Hustopeč et in declivitatibus Větrníky ad Dražovice pr. Vyškov (Pbr).

Placosphaeria campanulae Bäumler. Ad folia *Campanulae rapunculoidis* inter Heroltice et Březina (Bd).

Sphaeronema robiniae B. et C. In ramis *Tiliae parrifoliae* ad Okrouhlice (Bd) et ad Valečov pr. Něm. Brod Bohemiae (Pbr).

**Fusicoccum viridulum* (Bonn.) Sacc. Ad ramos *Ribis* sp. in hortis urbanis in Místek (Bd).

Ascochyta daturae Sacc. In foliis *Daturae stramonii* ad Kunovice pr. Uh. Hradiště (Pbr).

Ascochyta medicaginis Bres. Ad folia *Medicaginis sativae* ad centralem sepulcrorum locum Brunae (Bd).

Coronillae variae ad Loreta pr. Jičín Bohemiae (Bd).

Ascochyta Davidiana Kab. et Bub. Ad folia *Clematidis rectae* in declivitate Kamenný kopec ad Nový Lískovec pr. Brno. Spor. flavide-fuscescentibus, 16—20 μ longis, 4—4.8 μ latis, pycnidiis ca. 250 μ diam. *Ascochyta indusiata* Bres., quae sporis 6 μ latis, cum *Ascochyta Davidiana* Kab. et Bub. congruere posse videtur. Si res ita est, deinde

Ascochyella Davidiana Kab. et Bub. *Ascochyella indusiata* (Bres.) nominanda eset.

Diplodina Menthae Picbauer. Ad folia *Menthae longifoliae* ad Set. Antoníček pr. Brno (Pbr).

Diplodina medicaginis Oud. Ad caules *Medicaginis sativae* ad Vážany pr. Slavkov et Uh. Hradiště (Bd).

***Diplodina Artemisiae** Bres. Ad caules *Artemisiae vulgaris* ad arcem Veveří (Pbr).

Septoria bupleuri falcati Died. Ad folia *Bupleuri falcati* in declivitatibus ad Pouzdřany pr. Hustopeč (Pbr).

***Septoria agrimoniae eupatoriae** Bonn. et Russ. Ad folia *Agrimoniae eupatoriae* ad Vohančice pr. Tišnov et ad Rožnov p. R. (Pbr).

Septoria anemones Desm. Ad folia *Anemonis nemorosae* ad Jihlava (Pbr).

Septoria berberidis Niesl. Ad folia *Berberidis vulgaris* in declivitate Květnice ad Tišnov (Bd et Pbr), ad Mohelno (Pbr).

Septoria cytisi Desm. Ad folia *Cytisi nigricantis* ad Ketkovice pr. Náměšť n. Osl. Sporis 80 μ longis ac 3·2 μ latis (Pbr).

Cytisi ratisbonensis eodem loco. Sporis 64—70 μ longis ac 3·2 μ latis (Pbr).

Septoria galeopsidis West. Ad folia *Galeopsidis tetrahit* in silva Wilsoni ad Brno (Pbr).

Septoria gei Rob. et Desm. Ad folia *Gei urbani* ad Mohelno (Pbr).

Septoria hippocastani Berk. et Br. Ad folia *Aesculi hippocastani* inter Březina et Tišnov (Bd et Pbr).

Septoria hyperici Desm. Ad folia *Hyperici hirsuti* ad Mohelno (Pbr).

Septoria orchidearum West. Ad folia *Listerae ovalae* ad Hutisko pr. Rožnov p. R. (Pbr).

Septoria salviae Passer. Ad folia *Salviae silvestris* ad Hustopeč, sed sporis minoribus (Pbr).

Septoria scleranthi Desm. Ad folia caulesque *Scleranthi annui* ad Rožnov p. R. (Pbr).

Septoria urticae Desm. et Rob. Ad folia *Urticae urentis* in Popice ad Hustopeč, in Vranovice ad Brno, in Uh. Hradiště et Kunovice, in Netín pr. Vel. Meziříčí (Pbr).

Septoria tritici Desm. Ad folia *Tritici vulgaris* ad Něm. Knínice, Krumvíř ad Čejč.

Septoria chelidonii Desm. Ad folia *Chelidonii majoris* in Vlčí doly ad Hradčany pr. Tišnov (Bd).

Septoria ficariae Desm. Ad folia *Ranunculi ficariae* ad Loštice (Pbr).

***Septoria prostrata** Kab. et Bub. Ad folia *Homogynis alpinae* in montibus Jeseníky in monte Hokšár (Pbr).

***Rhabdospora globulariae** Hollós. Ad caules *Globulariae Willkommii* in declivitate Turolu ad Mikulov (Pbr).

Rhabdospora pleosporoides Sacc. Ad caules *Gei urbani* ad molam Prostřední pr. Střelice (Pbr).

Rhabdospora saxonica Bub. et Krieger. Ad caules *Solidaginis virginis aureae* in silvis ad Žebětín pr. Brno (Pbr).

***Rhabdospora betonicae** Sacc. et Br. Ad caules *Betonicae officinalis* ad molam Podskalčí pr. Střelice (Pbr).

***Rhabdospora scrophulariae** Karst. Ad caules *Scrophulariae nodosae* in declivitate Hornek ad Líšeň pr. Brno. Sporis 32—48 μ longis ac 1.6 μ latis (Pbr).

Rhabdospora euphrasiae Piebauer sp. n.

Pycnidiis primo tectis, deinde epidermide lacerata liberis, 280—340 μ diam., cca. 280 μ altis, subglobosis, nigris, poro cca. 37 μ lato apertis, cca. porum contextu paulum obscuriore coronatis, contextu extus brunneolo, intus brunneole-lutescente parenchymatico.

Sporis fibrillaeformibus, rectis vel curvulis, uno fine crassioribus ac rotundate abeisis alteroque fine attenuatis ac acutulis, hyalinis, 4 septatis, 38—50 μ longis ac 1.7 μ latis.

Habitat ad caules *Euphrasiae odontitis* (*Odontitis rubrae*) ad Troubsko vicinam a Brno urbe ad occid. versus. 1. V. 1926 ipse legi. A *Rhabdospora eupyrenoides* Sacc. pycnidiis apapillatis ac sporis valde minoribus differt.

Coniothyrium olivaceum Bon. var. **Ononidis** Allesch. Ad caules *Ononidis spinosae* in declivitate Děvín in montibus Pavlovensibus. Sporis 4.8—6.4 μ longis ac 2.4—3.2 μ latis; advenit communiter cum *Pleospora ononidis* (Pbr).

Diplodia rudis Desm. Ad ramulos *Cytisi Kitaibellii* in declivitate Větrníky ad Dražovice pr. Vyškov (Pbr).

Diplodia scoparii Petr. Ad ramos *Sarothamni vulgaris* ad Kyjov pr. Vel. Meziříčí. Sporis primum unicellularibus, lutescentibus, deinde septatis ac luteo-fuscescentibus, denique castaneo-brunneis, 25—29 μ longis ac 10 μ latis (Pbr).

***Botryodiplodia forsythiae** Jaap. Ad ramos *Forsythiae* sp. in Hlučín Silesiae (Bd et Pbr).

***Hendersonia canina** Brun. Ad fructus *Rosae caninae* in declivitate Kamenný kopec ad Bohonice pr. Brno. Sporis $11.5-15.4 \mu$ longis ac $5.7-6.4 \mu$ latis, tri-rare 5 septatis, brunneolis, media parte latissimis, pediformibus, ad fines attenuatis, infima cellula saepissime dilutioribus, juventute hyalinis ac uniseptatis; stipitibus sporarum $19-31 \mu$ longis ac 1.5μ crassis, hyalinis (Pbr).

***Hendersonia genistaecola** Hollós. Ad ramulos *Genistae pilosae* ad Mohelno. Differt pycnidiis minoribus, $126-180 \mu$, rare usque 200μ diam., nigris, perlluxis obscure fuscis, poro 16μ lato apertis; sporis $25.6-41 \mu$, rare usque 48μ longis ac $4.8-5.5 \mu$ latis, sporis leptosphaeriarum similibus, primo hyalinis, deinde luteo-fuscis ac castaneo-brunneis, 8-10 septatis, perfecte maturis omni cellula vacuola praeditis ac ad septa leviter constrictis (Pbr).

Camarosporium coluteae (P. et C.) Sacc. Ad ramos *Coluteae arborescentis* in declivitate Čebinka ad Tišnov (Pbr).

Gloeosporium umbrinellum Berk. et Br. Ad folia quercuum in declivitate Hornek ad Brno (Bd et Pbr), ad Střelice (Pbr).

Gloeosporium tiliae Oud. var. **maculicolum** Allesch. Ad folia *Tiliae cordatae* ad Tršice pr. Olomouc, Budkov ad Jemnice, ad centralem sepulcrorum locum Brunae (Bd), ad Jevišovice pr. Znojmo (leg. Noha), ad Veverí Bitýška (Bd et Pbr), ad Liskovec, Žebětín, Střelice (Pbr).

***Gloeosporium lagenarium** (Pass.) Sacc. et Roum. Ad folia *Cucumis sativae* in Slavonin ad Olomouc (Schola agronomica).

Gloeosporium carpini (Lib.) Desm. Ad folia *Carpini betuli* in Lužánky et Špilberk Brunae, in Pisárky ad Brno (Pbr).

Marsonina rosae (Lib.) Died. Ad folia *Rosae caninae* ad Tišnov (Pbr), ad Chotěbuzy pr. Čes. Těšín (leg. Nakládal).

***Pestalozzina hendersonioides** (Fautr. et Laub.) Died. Ad caules emortuos *Bupleuri falcati* in declivitate Dálka ad Čebín (Bd), et in declivitate Čebinka ad Tišnov (Pbr).

Melanconium Desmazieri (B. et Br.) Sacc. Ad ramos *Tiliae* sp. in Hlučín Silesiae (Bd et Pbr).

***Leptothyrium polygonati** Tassi. Ad folia *Polygonati multiflori* in silva Království dicta ad Grygov pr. Olomouc (Pbr).

Leptostromella hysteroioides (Fr.) Sacc. Ad caules *Cytisi nigricantis* ad Kurdějov pr. Hustopeč (Pbr).

Oidium hyssopi Eriks. Ad folia *Hyssopi officinalis* in Pisárky ad Brno (leg. Ing. Appl).

Oidium evonymi japonici (Arcang.) Sacc. Ad folia *Evonymi japonici* in Žabovřesky pr. Brno.

Oldium erysiphoides Fr. Ad folia *Lini usitatissimi* ad Puchýrna pr. Třešť (Bd).

**Oedocephalum glomerulosum* (Bull.) Sacc. Ad sclerotia varia et ad chartam in instituto nostro (Ing. Rozsypal).

Penicillium candidum Link. Ad boletos pr. Březina ad Tišnov (Bd).

Sepedonium chrysospermum (Bull.) Fr. Ad *boletos* et *Agaricinas* ad Březina et in declivitate Čebinka ad Tišnov (Bd).

Ovularia asperifolii Sacc. var. *Symphyti tuberosi* Allesch. Ad folia *Symphyti tuberosi* inter Holasice et Novojice ad Bučovice (Pbr).

Mycogone rosea Link. Ad pileos *Amanitae rubescentis* in convalli rivi Pejškovensis ad Tišnov (Bd).

Russulae sp. in Čebinka declivitate et ad Březina pr. Tišnov (Bd).

Mastigosporium album Riess. Ad folia *Alopecuri pratensis* et *Phlei pratensis* ad Rožnov p. R. (Bd et Pbr).

Ramularia urticae Ces. Ad folia *Urticae dioicae* in ripa Svatkové fluminis a Tišnov ad meridiem versus (Bd).

**Ramularia lychnicola* Cook. Ad folia *Melandryi albi* ad molam Podskalčí pr. Střelice (Pbr).

Ramularia macularis (Schröt.) Sacc. Ad folia *Chenopodii boni Henrici* in Netín (Pbr).

**Ramularia aequivoca* (Ces.) Sacc. Ad folia *Ranunculi bulbosi* in declivitate Einsiedliten ad Znojmo (Pbr).

Ramularia oreophila Sacc. Ad folia *Astrantiae majoris* infra monte Kriváň in montibus Fatra Slovakiae (Pbr).

Ramularia epilobii rosei Lindau. Ad folia *Epilobii rosei* ad Soběšice pr. Brno (Pbr).

Ramularia montana Speg. Ad folia *Epilobii montani* in declivitate fruticosa Lišti ad Třebíč (Pbr).

Ramularia armoraciae Fuck. Ad folia *Armoraciae rusticanae* in horto botanico scholae agronomicae Brunae (Pbr).

**Ramularia Schröteri* Sacc. et Syd. Ad folia *Levistici officinalis* in Netín ad Vel. Meziříčí (Pbr).

Ramularia stachydis (Pass.) Mass. Ad folia *Stachydis rectae* ad molam Kartouzský pr. Střelice ad Brno (Pbr).

Stachydis germanicae ad Mohelno (Pbr).

Ramularia coccinea (Fuck.) Vesterg. Ad folia *Veronicae officinalis* ad Karlova Studánka in montibus Jeseníky saepissima (Pbr).

Ramularia pseudococcinea Lindr. Ad folia *Veronicae chamaedrys* ad Adamov (Pbr).

Ramularia nivea (Unger) Picbauer comb. n. Ad folia *Veronicae chamaedrys* ad Rožnov p. R. (Pbr).

Ramularia macrospora Fres. Ad folia *Campanulae rapunculoidis* ad Soběšice pr. Brno (Pbr).

***Ramularia cupulariae** Pass. Ad folia *Inulae conyzae* in declivitate Květnice et Čebinka ad Tišnov (Pbr et Bd).

***Ramularia scabiosae** Jasp. Ad folia *Scabiosae ochroleucae* in declivitate Kamenný kopec ad Bohonice pr. Brno (Pbr).

Coniosporium arundinis (Corda) Sacc. Ad folia caulesque *Phragmitis communis* ad Chvalkovice pr. Olomouc et ad Blučina pr. Židlochovice (Pbr).

Fusicladium radiosum (Lib.) Lindau. Ad folia *Populi tremulae* ad Žebětín et in convalli Říčka ad Brno, ad Netín (Pbr).

Scolecotrichum graminis Fuck. Ad folia *Arrhenatheri avenacei* ad Nový Liskovec pr. Brno (Bd);

Poa nemoralis in Kamenný kopec ad Brno (Bd).

Cladosporium fuliginum Bonord. Ad pileos *Russulae spec.* in silva Nýrsko ad Tišnov, ad Březina pr. Tišnov (Bd).

Cercospora ferruginea Fuck. Ad folia *Artemisiae vulgaris* in convalli Bobravae fluminis ad Střelice (Pbr).

***Cercospora resedae** Fuck. Ad folia *Resedae luteolae* in Hodonice pr. Znojmo (Pbr).

Cercospora paridis Eriks. Ad folia *Paridis quadrifoliae* ad Mouřínov pr. Bučovice (Pbr).

Cercospora violae Sacc. Ad folia *Violae hirtae* ad Ketkovice pr. Náměšť n. Osl. (Pbr).

Helminthosporium tiliae Fr. Ad ramos *Tiliae sp.* in Vel. Opatovici (Bd), et in Pisárky ad Brno (Pbr).

Hymenula musae Pat. Ad fructus musarum Pragae Bohemiae (Bd).

***Dendryphium toruloides** (Fress.) Sacc. Ad caules *Lunariae redivivae* in convalli Pustý Žleb pr. Macocha locum praeruptum (Pbr).

Alternaria brassicae (Berk.) Sacc. var. **macrospora** Sacc. Ad folia *Brassicae oleraceae* ad Němčice pr. Židlochovice et in Černá pole ad Brno (leg. Ing. Kalandra).

Stilbella erythrocephala (Ditm.) Lindau. Ad fimum cuniculinum in declivitate Hády (Pbr) et ad locum exercitationis militaris ad Sct. Antoníněk pr. Brno (Pbr et Bd).

Isaria farinosa (Dicks.) Fr. Ad corpus *Liparidis monachae* ad Netín pr. Vel. Meziříčí (Pbr).

Tilachlidium tomentosum (Schräd.) Lindau. Ad sporangia *Dictydii*

cancellati et *Cribrariarum* in silva Jedlovec ad Netín et in silva Nádavky ad Záseka pr. Vel. Meziříčí (Pbr).

**Aegerita torulosa* (Bonord.) Sacc. Ad lignum in hortis castellanis in Vel. Opatovice ad Jevíčko (Bd).

Tubereulina persicina (Ditm.) Sacc. In aecidiis *Uromycis pisi* in *Euphorbia cyparissias* in declivitate Annaberk, Sv. Kopeček ad Mikulov; in clivo Malý Manín ad Zaskalje Slovakiae occid. (Pbr);

Puccinia arrhenatheri in foliis *Berberidis vulgaris* in declivitate Hornek ad Líšeň (Pbr).

Tubercularia vulgaris Tode. Ad radices *Pini silvestris* in silva Bačkovce ad Březina (Bd).

Tubercularia nigricans (Bull.) Link. Ad ramos *Tiliae cordatae* in hortis urbanis in Lipník n. B. et in Drásov ad Tišnov (Bd).

Fusarium roseum Link. Ad radices *Medicaginis sativae* ad Uh. Hradiště.

Fusarium heterosporum Nees. Ad spicas *Secalis cerealis* ad Třešť (Bd).

Fusarium Ustilaginis Kell. et Sw. In *Ustilagine Panici milliacei* ad Mor. Krumlov (Pbr)

Vermicularia graminicola West. Ad culmos *Poa* sp. ad Švamberk Bohemiae merid. (leg. Dr. K. Holý).

Myrothecium inundatum Tode. Ad pileos *Russularum* in declivitate Čebinka ad Tišnov (Pbr).

Exosporium tiliae Link. Ad ramos *Tiliae parvifoliae* ad molam in Plavý ad Tannwald Bohemiae septentr. (Bd).

Tiliae grandifoliae ad aedem sacram in Lipník n. B. (Bd).

Rhizoctonia violacea Tull. Ad radices infimasque partes caulis *Sojae hispidae*, *Hyssoi officinalis*, *Cirsii arvensis*, *Brassicae oleraceae*, *Chaenorrhini minoris*, *Polygoni avicularis*, *Raphani sativi*, *Helianthi annui*, *Trifolii pratensis*, *Tritici repentis*, *Chenopodii albi*, *Althaeae officinalis*, *Silenis dichotomae*, *Papaveris somniferi*, *Medicaginis lupulinae*, *Betae vulgaris*, *Plantaginis lanceolatae*, *Petroselinii sativi*, *Brassicae oleraceae capitatae*, *gongyloidis* in agro instituti agronomici in Pisárky-Brno (Bd me teste).

TISKEM POLYGRAFIE V BRNĚ.